外臺祕要方卷第二十三 癭瘤咽喉癧瘻二十八門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

癭病方一十八首
氣癭方一十首
五癭方八首
灸癭法一十三首
瘤方三首
白瘤及二三十年瘤方三首
喉痺方二十一首
咽喉中閉塞方三首
喉舌生瘡爛方八首
喉咽生瘡方四首
咽喉腫方五首

靜嘉堂文庫所藏

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首
懸癰腫方三首
咽喉雜療方四首
寒熱瘰癧方一十一首
瘰癧結核方四首
惡核瘰癧方四首
癰腫瘰核不消方五首
鼠瘻及瘰癧方一十一首
毒腫瘰癧方四首
灸瘰癧法六首
九瘻方三十五首
諸瘻方一十五首
腋臭方三十七首
漏腋方三首
七孔臭氣方三首
令人體香方四首
雜療汗出不止方一十首

癭病方一十八首

病源癭者由憂恚氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脈搏頸下而成之初作與瘿核相似而當頸下也皮寬不急垂搥搥然是也恚氣結成癭者但垂核搥搥然無脉也飲沙水成癭者有核瘰瘰然無根浮動在皮中又云有三種癭有血癭可破之息肉癭可割之有氣癭可具針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作癭病動氣增患出第三十一卷中

肘後療頸下卒結囊漸大欲成癭海藻酒方

海藻一斤去鹹　清酒二升

靜嘉堂文庫所藏

右二味以絹袋盛海藻酒漬春夏二日一服二合稍稍含咽之日三酒盡更以酒二升漬飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三盡更作三劑佳崔氏文仲同

又方

昆布海藻等分末之蜜丸含如杏核大含稍稍咽汁日四五

並出中卷

深師療癭方

桂心　昆布洗　海藻洗　甘草炙

白蘞熬各三分　龍膽　海蛤研　土瓜根

半夏洗　吳茱萸　牡蠣熬各一兩

右十一味爲散酢漿水服五分匕先食日三十日知盡藥愈

節食鹽羊肉餳生葱菘菜

又方

海藻洗二分　龍膽二分　昆布洗二分　土瓜根二分

半夏洗二分　小麥麪炒二分

右六味爲散先食酒服方寸匕日三三十日知三十日愈忌羊肉餳並出第二十九卷中

小品癭病者始作與癭核相似其癭病喜當頸下當中央不偏兩邊也乃不急膇直僞切重膇病也然則是癭也中國人息氣結癭者但垂膇膇無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜癭有核瘰瘰耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則令腎實故病癭也北方婦人飲沙水者産乳其於難非針不出是以比家有不救者良由此也

療癭方

小麥一升

淳苦酒一升漬小麥令釋漉出暴燥復漬使苦酒盡暴麥

靜嘉堂文庫所藏

燥擣篩以海藻三兩別擣以和麥末令調酒服方寸匕日三禁
鹽生魚生菜猪肉肘後崔氏備急云療三十年癭瘰集驗
文仲范汪等同出第十卷中肘後用海藻五兩

集驗療癭酒方

是水雨經露出柳根三十斤

右以水一斛煮得五斗同米三斗釀之酒成先食服一升日
三范汪同出第四卷中

崔氏海藻散療癭方

海藻八兩洗去鹹汁　貝母二兩　土瓜根二分
小麥麴二分炒

右四味作散酒服方寸匕日三

又方

秫米三升依酒法炊

右一味取圓葉白楊皮十兩去上蒼者愼勿令見風細切
以水五升煮取二升濃汁漬麴末五兩用前件秫米依酒法
釀之熟訖封塞一七日然後空腹服一大盞日再服三日內
即効神驗無比並出第四卷中

張文仲隱居効驗療癭方

昆布洗　松蘿各三分　海藻五分

右三味擣蜜丸如杏核大含咽津日三夜二大佳備急肘後
同

又療癭司農楊丞服効第一方

昆布六分洗　海藻七分　松蘿　乾薑
桂心各四分　通草五分

右六味擣篩蜜丸如梧子一服吞七丸即住在頸下癭處欲
至食時即先飲少酒下却丸子然進食禁酢蒜鹽酪臭肉

靜嘉堂文庫所藏

倉米等若癭大者加藥令多取差

又第二方

昆布洗 海藻洗各一斤

右二味細切好酒五升浸七日量力取數服酒盡以酒更浸兩遍藥力盡當以此酒下前丸藥益善備急肘後同

又方

小麥三升

右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴乾擣篩為散別擣昆布為散每服取麥散二匕昆布散一匕旦飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即差多服彌善無所禁但不用舉重及悲啼煩惱等事肘後備急集驗同

又含丸方

檳榔三兩 馬尾海藻三兩洗 昆布三兩洗

右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一丸徐徐令津液取汁咽之忌鹽並楊丞方服驗肘後備急同並出第六卷中

救急療癭要切方

鼠粘草根一大升洗

右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病即差一方削除皮細切取三大升擣篩為散蜜和丸如梧子一服二十丸日再服之稍稍加至三十丸以無灰酒進之出第五卷中

古今錄驗療氣癭方晉州熙公奏徐公方

問荆一兩出海島 羖羊靨五具去脂炙 白斂各[illegible][illegible]

甘草一分各炙 小麥麴末二兩熬

右六味擣篩為散羊靨一種別擣為末相和好漿[illegible]更擣作丸

如小棗大一服五丸無禁

又方（肘今檢[illegible]宗是二方）

羊靨一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作丸服

忌愼如常藥法

又方

取羊靨一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含便差

又療癭海藻散方

海藻（十分洗）　昆布（一兩洗）　海蛤（一兩研）　通草（一兩）

菘蘿（洗）　乾薑　桂心（各二兩）

右七味下篩酒服一錢匕日三（出第四十一卷中）（肘後無乾薑有白斂）

氣癭方一十首

廣濟療氣癭氣胷膈滿塞咽喉項頸漸麤昆布丸方

昆布（二兩洗去鹹汁）　通草（一兩）　羊靨（二七枚炙）

馬尾海藻（一兩洗去鹹汁）　海蛤（一兩研）

右五味蜜丸如彈子細細含咽汁無食苛後忌生菜熱麪炙肉

蒜筍

又療冷氣築咽喉噎塞兼癭氣昆布丸方

昆布（八分洗）　乾薑（六分）　犀角（六分屑）

吳茱萸（四分）　人參（八分）　馬尾海藻（四分洗）

葶藶子（六分熬）　杏人（八分去皮尖熬）

右八味擣篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷熱麪炙肉魚蒜

筍粘食陳臭等

又療氣妨塞方

昆布（三兩洗）　菘蘿　通草　柳根鬚（各三兩逆水生者）

右四味擣篩蜜丸如彈丸大以海藻湯浸細細含之咽盡勿停

忌舉重生嗔憂悲等

靜嘉堂文庫所藏

又療癭細氣方

昆布(十二分洗) 馬尾海藻(十分洗) 杏人(各八分去皮尖熬)

通草(二分) 麥門冬(六分去心) 連翹子(六分)

乾薑 橘皮(各六分) 茯苓(八分) 松蘿(三兩)

右十味含乃以齒微微嚼藥袋子汁出入咽中日夜勿停

有問荆加四分佳忌嗔及勞油膩粘食並出第二卷中

深師蘇子膏療氣癭方

臘月猪脂(一升) 蘇子 桂心 大黃

當歸 乾薑 橘皮 蜀椒(各三分汗)

右八味切以水六升煑取二升去滓内猪脂消盡服差忌生

葱出第二十九卷中

崔氏云凡水癭氣癭可差石癭不可治療氣癭方

平旦手挽癭令離項搯(他勞切)其下根脉斷愈一日一

度搯易愈者七日如難差者三七日愈

又方

昆布(二兩洗) 海藻(二兩洗) 龍膽(一兩) 馬刀(半兩炙)

海蛤(半兩研) 大黃(一分) 熏黃(半兩)

右七味擣蜜丸如梧子大破除日以綿裹一丸含咽津朝暮

空腹服忌五辛猪肉

又方

海藻(二兩洗)

右一味以淳酒四升漬二宿漉去滓細細暖含咽之盡即更

造取差爲度范汪同並出第四卷中

必効主氣癭方

白頭翁(半兩) 昆布(十分洗) 海藻(七分洗) 通草(七分)

玄參 連翹子(各八分) 桂心(三分) 白斂(六分)

靜嘉堂文庫所藏

右八味擣篩蜜丸如梧子五丸若冷用酒服禁蒜麪猪魚生葱出第五卷中

古今錄驗療癭有在咽喉初起游氣去來陰陽氣相搏遂停住喉中前不去腫起如斛羅諸療不差小麥湯方

小麥三升 昆布二兩洗去鹹 厚朴一兩炙 橘皮

附子炮 海藻洗各二兩 生薑五兩 半夏五兩洗

白前三兩 杏人一百枚去尖皮

右十味切以水一斗煑取三升半分五服相去一炊頃忌猪羊肉餳冷水出第四十一卷中

五癭方八首

深師五癭丸方

取鹿靨以酒漬令没炙乾内酒中更炙令香咽汁味盡更易十具愈千金翼同出第二十九卷中

范汪療五癭方

昆布三兩洗 海蛤二兩研 松蘿三兩 海藻三兩洗

通草 白斂 桂心各二兩

右七味作散酒服方寸匕日三千金翼同出第四十二卷中

千金療石癭勞癭泥癭憂癭氣癭方

海藻洗 龍膽 海蛤研 通草

昆布洗 礜石燒 松蘿各三分 小麥麴四分熬

半夏二兩洗

右九味作散酒服方寸匕日三禁食魚猪肉五辛生菜羊肉餳十日知二十日愈

又方

昌蒲二兩 海蛤一兩研 白斂一兩 海藻一兩洗

松蘿一兩 桂心一兩 椒一兩汗 羊靨百枚

靜嘉堂文庫所藏

半夏洗一兩　續斷一兩　神麴三兩　到桂草一兩

右十二味擣作散以醬漬羊牛髓脂爲丸如梧子日服三丸忌羊肉生葱等翼同

又方

小麥麪一升　特生礜石一斤燒　海藻一斤洗

右三味三年酢一升漬小麥麪暴乾更漬令酢盡乾各擣下篩每服兩方寸匕日四五服含乃咽之忌薑辛生菜猪魚大誦大語吹火用氣翼深師用小麥麪一斗餘同並出第二十五卷中

千金翼五癭方

海藻一兩洗　昆布洗　半夏洗　細辛

土瓜根　松蘿各一兩　白歛　龍膽各二兩

海蛤二兩　通草二兩

右十味作散酒服方寸匕日再忌羊肉餳生菜葱不得勞動

又方

昆布二兩洗

右一味切如大指酢漬含咽汁盡愈

又方

海藻一斤　小麥麪一斤

右二味以三年酢一升溲麪暴令乾往復漬令酢盡作散酒服方寸匕日三忌怒出第十一卷中

灸癭法一十三首

千金灸諸癭法

灸肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯再三以差止

又法

靜嘉堂文庫所藏

灸風府百壯風府夾項兩邊兩穴兩耳上髮際中

又法

灸大椎兩邊相去各一寸半小下垂各三十壯

又法

灸頸衝頸衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所住處灸之各隨年壯凡灸五處九穴異深師並同

又癭上氣并短氣方

灸肺俞一百壯

又癭上氣胷滿法

灸雲門五十壯

又癭惡氣方

灸胷堂百壯

又癭惡氣法

灸天府十五壯

又癭勞氣法

灸衝陽隨年壯在肘外屈橫文頭是據此是曲池穴衝陽在足趺上

五寸

又瘰癭法

灸天瞿三百壯橫三間寸灸之

又癭氣面腫法

灸通天五十壯在耳上二寸

又灸癭法

灸中封隨年壯在兩足趺上曲尺宛宛中並出第二十五卷中

又灸癭法

灸耳後髮際有一陰骨骨間有一小穴亦有動脉準上

靜嘉堂文庫所藏

前灸大効出第六巻中已上究所在具三十九巻明堂

中

瘤方三首

肘後云皮肉中忽腫起初如梅李漸長大不痒不痛又不堅強按之柔軟此血瘤也不療乃至如盤大則不可復消而非殺人病爾亦慎不可破方乃有大療今如覺但依瘿家療療若不消更引別大方出中巻

深師療瘤脂細瘤方

呉茱萸一分 礬石燒 芎藭 當歸

大黄 黄連 芍藥 白斂

黄芩各二分

右九味合擣下篩和雞子塗著細故熟布上隨瘤大小薄厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿脂細細從孔中出探知膿血盡著生肉膏若膿不盡復起故也生肉膏方如左

又生肉膏療癰瘤潰漏及金瘡百瘡悉療之方

真當歸 附子炮 甘草 白芷

芎藭各一兩 薤白一兩 生地黄三兩

右七味㕮咀以猪膏三升半合微火煎白芷黄去滓稍以傅瘡上日三良出第二十九巻中千金並同

千金云凡肉瘤勿療療則殺人慎之慎之出第二十五巻中

千金翼療瘤病方

麞鹿二種肉割如厚脯火炙令熱搨掩可四炙四易痛膿便愈不除更炙新肉用之良出第二十四巻中

白瘤及二三十年瘤方三首

千金翼白瘤方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮瘡上

靜嘉堂文庫所藏

洗之日三即愈

又方

白礬　硫黃等分

右二味末以酢和封上並出第二十四卷中

千金陷腫散主二十三十年瘤癭及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或大如杯盂升斗十年不差致有漏潰令人骨消肉盡或堅或𡖖或潰令人驚惕寐寤不安體中掣縮愈而復發療之方千金翼云陷麥散

烏賊魚骨一分　白石英二分　石硫黃一分

紫石英二分　鍾乳二分研　乾薑一兩

丹參三分　琥珀一兩研　大黃一兩

附子一兩炮　胡鷰屎一兩

右十一味爲散貯以韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅之若瘡乾無汁者以猪膏和傅日三四以乾爲度若汁不盡者至五劑十劑止勿措意不作也著藥令人不疼痛若不消加芒消二兩益佳忌猪肉出第二十五卷中翼無胡鷰屎

喉痺方二十一首

病源喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛脉沈者爲陰浮者爲陽若右手關上脉陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手拓兩頰手不動摟肘使急腰內亦然住定放兩肋頭向外附膊腰氣散盡勢大悶始起來去七通去喉痺出第三十一卷中

廣濟療喉痺急疼悶妨不通方

靜嘉堂文庫所藏

馬蘭根切一升 升麻三兩 瞿麦二兩 射干十兩
犀角二兩屑之 通草二兩 玄參三兩
右七味切以水八升煑取二升去滓細細含咽一日令盡得破膿愼熱麪炙肉蒜
又療喉痺方
馬藺子八分 牛蒡子六分
右二味擣爲散每空腹以煖水服方寸匕漸加至一匕半日再並出第二卷中
肘後療喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不下入七八日即殺人療之方
巴豆一枚開其口
右一味以綿裹極堅令有繩出外以巴豆内鼻中隨腫左右時時吸氣半日許即差無巴豆用杏人以塞耳如之文仲范汪同
又方
熬杏人熟擣蜜丸如彈子含咽其汁亦可擣杏人末帛裹含之小品文仲備急范汪同
又方
礬石一兩水三升漬洗手足
又方
生地黃汁二升蜜二升合微火煎之取二升稍稍含之
又方
射干 當歸各二兩
右二味切以水三升煑取一升稍稍含之吐去更含
又方
剝葫塞耳鼻孔日再易之有効
又方
昌蒲根嚼燒秤鎚令赤内一杯酒中沸止飲之文仲備急同

靜嘉堂文庫所藏

又療喉痺方　射干一片含咽汁

又方　升麻斷含之喉塞亦然

又方

桔梗（三兩）

右一味切以水三升煮取一升頓服之忌猪肉

又方

取芥子擣碎以水及蜜和滓傅喉下燥輒易

又傳用神效方

桔梗　甘草（炙各一兩）

右二味切以水一升煮取服即消有膿即出備急同忌猪肉

海藻菘菜

又療垂死者方

擣馬藺根一握少以水絞取汁稍稍咽之口噤以物拗灌

之神良

古今録驗雞子湯療喉痺方

半夏末方寸匕

右一味開雞子頭去中黃白盛淳苦酒令小滿内半夏末著

中攪令和雞子著刀子鐶令穩炭上令沸藥成置杯中及煖

稍咽之但腫即減忌羊肉餳肘後文仲同（此與仲景苦酒湯同半夏不可作末

剖之可也）

又療喉痺塞射干丸方

射干（二兩）　豉（三合）　芎藭（一兩）　杏人（去尖皮各一兩）

犀角（一兩）　升麻（二兩）　甘草（一兩炙）

右七味擣下篩蜜和丸含之稍稍咽津日五六忌海藻菘菜

又射干湯療喉痺閉不通利而痛不得飲食者若閉喉并

靜嘉堂文庫所藏

諸疾方

當歸二兩　升麻一兩　白芷三兩　射干

甘草炙　犀角屑　杏人去尖皮各一兩

右七味切以水八升煑取一升半分服神良忌海藻菘菜出第二十九卷中

近効療喉痺方

大附子一箇刮去皮作四片

右一味以蜜塗火上炙稍熱即含咽汁甜盡又取一片準前含如已作頭即膿出如未作頭立消神驗忌猪肉冷水

又方

朴消一兩細細含咽汁一食頃差

又若腫全盛語聲不出者方

大附子一枚炮令裂削去皮切如豆

右一味含一塊咽汁半食間即差烏頭亦得忌猪肉冷水

咽喉中閉塞方三首

廣濟療咽喉中塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

升麻　通草　黃蘗　玄參各八分

麥門冬十分去心　竹茹　前胡各六分　芒消十分

右八味切以水八升煑取二升五合去滓内消温分三服服別如人食頃自利去消

又方

生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌塘火煨沸起擎下沸定更三度成就熱飲酢盡不過一二即差並出第二卷中

近効療喉痺喉咽塞喘息不通須臾欲絕神驗方

馬蘭根葉二大兩

右一味切以水一大升半煑取一大盞去滓細細喫須臾即通

靜嘉堂文庫所藏

絡石草亦療煎法分兩亦同

喉舌生瘡爛方八首

肘後療喉口中及舌生瘡爛方

含好淳苦酒即愈文仲備急同

又方

酒漬蘘荷根半日含漱其汁

又方

杏人二十枚　甘草十一　黃連一分

右三味末綿裹含之千金同

又方

礬石二兩燒去汁　黃連一分末

右二味同研內口中令布瘡上

又方

黃連一兩

右一味切以水三升煑取一升稍稍含冷吐忌猪肉冷水

又文仲療口中及舌生瘡爛方

取牛膝根酒漬含漱之無酒者但亦取含之肘後同

又方

剉黃蘗含之肘後同並出第七卷中 [illegible]

備急療喉中及舌生瘡爛方

剉薔薇根濃煑汁含漱之冬用根夏用枝葉文仲肘後[illegible]

同出第四卷中

咽喉生瘡方四首

廣濟療咽中生瘡吐血不下食方

生地黃五兩　青竹茹　玄參　雞蘇各二兩

茯苓　升麻　麥門冬去心各三兩

右七味切以水八升煑取二升五合去滓分温三服服相去如

靜嘉堂文庫所藏

人行七八里不能多服含細細咽亦得忌生冷熱麪炙肉油
酢出第五卷中

千金療口中塞及咽喉不利生瘡口燥膏方

猪膏一斤　白蜜一斤　黃連一兩

右三味合煎去滓攪令相得含如半棗日四五度

又療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸　射干根　升麻各一兩　附子半兩炮
白蜜四兩

右五味切以猪膏四兩先煎之成膏下著地勿令大熱內諸藥
微火煎附子色黃藥成絞去滓內蜜復上微火煎令相得盛
器中令凝取如杏子大含之日四五度稍稍咽之並出第六卷中

古今錄驗升麻湯療咽喉生瘡方

甘草一兩炙　升麻　石膏碎綿裹　牡丹皮各一兩

右四味切以水七升煮取三升一服七合日三忌海藻菘菜出
第二十九卷中

咽喉腫方五首

肘後咽喉卒癰腫食飲不過方

用薤一把擣傅腫上冷復易之用苦酒和亦佳范汪同

又方　吞薏苡人子二枚

延年療喉中熱腫方

鼠粘根切一升

右一味以水五升煮取三升去滓分溫三四服忌蒜麪出第
十九卷中

古今錄驗羚羊角豉湯療喉痛腫結毒氣衝心胷方

豉一升半綿裹　犀角二兩屑　羚羊角一兩屑
芍藥三兩　升麻四兩　杏人一兩去尖皮

靜嘉堂文庫所藏

梔子七枚　甘草二兩炙

右八味切以水七升煑取一升半去滓分三服忌海藻菘菜

又五香湯療諸惡氣喉腫結核方

沉香二兩　薰陸香一兩　麝香二分研湯成下

青木香二兩　雞舌香二兩

右五味以水五升煑取一升半去滓分三服並出第二十九卷中

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

范汪療卒喉中塞痛不得飲食方

取敗筆一枚燒屑以漿飲服一方寸匕良驗出第十五卷中

文仲療喉中卒毒攻痛方

章陸根切炙令熱隔布熨之冷轉易立愈姚云苦酒熱敖傅喉亦療喉痺肘後小品同

又方　擣艾傅之並出第七卷中

懸癰腫方三首

肘後療懸癰腫卒長數寸如指隨喉出入不得食方

開口捧頭以筯抑舌及燒小鐵於管中灼之令破止若不須爲苦可三爲之寧小根不盡勿大畢以鹽隨烙處塗之

又方

擣鹽綿纏筯頭點鹽傅以揩之日六七度文仲備急同

千金療懸癰垂暴腫長方

乾薑　半夏洗等分

右二味末之以少少著舌本出第六卷中翼同

咽喉雜療方四首

靜嘉堂文庫所藏

范汪療咽喉不利下氣丸方

射干根　附子炮　人參一

杏人去尖皮熬各一分

右四味合擣下篩蜜丸如梧子含一丸咽汁日三夜一忌猪肉冷水千金同

又療口中咽喉不利當歸含丸方

當歸末二兩　杏人一兩熬去皮尖

右二味擣合下篩以蜜和為丸如梧子二丸含漸漸咽汁日三夜再

又療咽喉中痛不利丸方

升麻　甘草炙　鬼臼　射干根

丹砂各一兩　雄黃一兩　杏人一十枚去皮尖　麝香半兩

右八味擣下篩和以蜜丸如梧子飲服一丸日三漸加之酒下亦得咽痛失聲不利用良忌海藻菘菜千金同出第五十卷中

崔氏療尸咽咽內瘡痛欲失聲方

桂心二兩　杏人一兩去尖皮熬　蕪荑一兩

右三味擣末合和綿裹含如杏人許咽汁消盡更含日三夜二忌膩食以外無忌出第四卷中

寒熱瘰癧方一十一首

病源此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結為瘰癧或如梅李等大小兩三相連在皮間而時發寒熱是也久則變膿潰成瘻也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云踑踞以兩手從脚入據地曲脚加其上舉尻其可用行氣愈瘰癧乳癰出第三十四卷中

甲乙鍼經寒熱瘰癧論黃帝問曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆

靜嘉堂文庫所藏

何氣所生岐伯對曰此皆鼠瘻寒熱之氣也稽留於脉而不去者也鼠瘻之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其浮於脉中未著於肌肉而外爲膿血者去易問曰去之奈何對曰請從其末引其本可使衰去而絶其寒熱審安其道以予之徐往徐来以去之其小如麥者一剌知三剌而已決其生死法反其人目視之其中有赤脉從上下貫瞳子見一脉一歳死見一脉半一歳半死見二脉二歳死見二脉半二歳半死見三脉三歳死此赤脉不下貫瞳子者可療出第八卷中千金同

廣濟療瘰癧丸方

鸛骨 狸骨並炙 射干 玄參
升麻炙 青木香 沈香 犀角屑
丁香 羚羊角屑 丹參 甘草各四分炙
人參 砂參各三兩 獺肝六分 連翹子六分

光明沙二分研

右十七味擣篩蜜丸以飲服十五丸日二服漸加至三十丸空腹服之不利忌生冷油膩血食井酢熱肉海藻菘菜粘食陳臭生血物等

又療瘰癧方

連翹子 射干 玄參 芍藥
青木香 芒消 升麻 梔子人擘
前胡 當歸 甘草炙 大黃各二兩

右十二味切以水一斗煑取三升分三服服別相去如人行十里快利忌生冷猪肉海藻菘菜蒜酢並出第五卷中

劉涓子療寒熱瘰癧散方

狸骨五兩炙 烏頭七分炮 黃連七分

右三味擣下篩先食以酒服一錢匕日三良忌猪肉冷水莧

靜嘉堂文庫所藏

汪同出第十卷中

千金療瘰癧方

白殭蠶爲散以水服五分匕日三十日差深師救急同

又方 於患人背兩邊腋下後文上隨年壯灸之

又方 灸耳後髮際七壯

又方

檞白皮三斤

右一味細切以水七升煮取三升去滓眞珠砂方寸匕和汁一升旦向日服之強行須臾吐鼠出三朝服良

又方

狸頭一枚灸擣下篩旦白飲服方寸匕日再服之

又方 狼糞灰封上良

又療寒熱瘰癧散方

連翹 土瓜根 龍膽 苦參

黃連 括樓 芍藥 常山皮各一兩

狸頭骨一枚炙

右九味擣下篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水翼集驗古今錄驗同一方云無狸頭骨加之名狸頭散餘同並出第二十四卷中

救急療瘰癧方

馬齒陰乾燒灰臘月猪膏和之以煖泔清洗瘡拭乾傅之日三出第三卷中

瘰癧結核方四首

廣濟療瘰癧息肉結硬薄方

白斂 甘草炙 青木香 芍藥

大黃各三兩 玄參三兩

靜嘉堂文庫所藏

右六味擣爲散少減以少酢和如稀泥塗故布貼上乾易之
勿停忌猪肉五辛熱肉飲酒熱麪等

又瘰癧結核令消散方

黄耆七分　玄參八分　連翹子　人參
升麻　青木香　茯苓　葈耳子
甘草炙　朴消　桂心各四分　枳實炙去瓤
大黄　羚羊角屑　麥門冬去心各五分　鼠粘子
苦參各九分

右十七味擣蜜丸如梧子以酒下十九日夜三四漸加至二三十丸
以知爲度忌生冷猪肉海藻菘菜酢生葱蒜陳臭等並出第
五卷中

肘後療頸下生瘰癧瘰如梅李宜使消之方

海藻一斤洗

右一味以酒三升漬數日稍稍飲之文仲備急等同

又方

人參　甘草炙　乾薑　白斂各四分

右四味擣篩酒服方寸匕日三忌海藻菘菜劉涓子文仲備急
同出第六卷中

惡核瘰癧方四首

文仲五香連翹湯療惡肉惡脉惡核瘰癧風結腫氣痛方

青木香　沈香　雞舌香各二兩　麝香半兩
薰陸香一兩　射干　紫葛　升麻
桑寄生　獨活　通草　連翹各二兩
大黄三兩　淡竹瀝二升

右十四味切以水九升煮取減半內竹瀝更煮取三升分三服
忌五辛古今録驗同出第五卷中 千金方無紫葛雞舌香有丁香

靜嘉堂文庫所藏

延年丹參湯療惡肉核瘰癧諸風氣結聚腫氣諸病並主之方

蒴藋　丹參各二兩　甘草炙　秦艽

獨活　烏頭炮　牛膝各一兩　躑躅花

蜀椒各半兩汗

右九味切以水八升煑取三升温服一升古今錄驗有白及餘並同忌海藻菘菜猪肉冷水

又玄參湯主惡核瘰癧風結方

玄參　升麻　獨活　連翹子各二兩

木防已　菊花各一兩

右六味切以水八升煑取三升分服一升日三文仲同

又丹參膏主惡肉結核瘰癧脉腫氣痛方

丹參八分　白斂　獨活　連翹子

白及各四分　升麻　蒴藋各六分　防已

玄參　杏人各五分去皮尖

右十味細切以生地黃汁淹漬一宿以鍊成猪膏四升微火煎五上五下藥成絞去滓以摩病處日三四

癰腫瘰癧核不消方五首

經效犀角丸療瘰癧方

犀角四分　升麻三分　大黃六分　牛蒡子八分

烏蛇十分炙去頭尾　玄參八分

右六味末之蜜和丸如梧子大每日至午後煎牛蒡湯下三十五丸

又方

龍骨八分　牡蠣八分熬

右二味末之酒下三錢匕日三度良

靜嘉堂文庫所藏

又大黃膏方

大黃六分　附子四分炮　細辛三分　連翹子四分

巴豆分

右五味以苦酒浸一宿以臘月猪膏煎三上三下去滓以綿濾之用傅之日三五度塗之良

集驗療寒熱瘰癧散方

連翹六分　土瓜根四分　龍膽五分　黃連四分

苦參六分　栝樓四分　芍藥五分

右七味為散食後溫酒下五分匕日三

又方

陵鯉甲二十一枚燒擣末傅瘡上効千金同

鼠瘻及瘰癧方一十一首

文仲療瘰癧方

苦參四大兩擣末生牛膝和丸如梧子食後煖水下十丸日三服

又方

昆布四分　海藻四分

右二味各洗去鹹擣末蜜和丸如杏核許大含之日三度良差

救急療鼠瘻久不差方

取狼鼠不限多少常作羹粥任喫之必驗千金經効同

范汪療鼠瘻瘰癧方

取臘月猪膏正月鼠頭燒令作灰以膏和傅之愈若不差者瘰癧右灸右肩頭三指度以下指灸炷皆如雞子大良若不能堪者可如中黃亦可已試有良驗

又療頸鼠瘻累累者方

貝母　乾薑　藁本

桂心　蜀椒各一分汗

靜嘉堂文庫所藏

右五味擣下篩先食吳茱萸一分以酒服一撮忌生葱

又療鼠瘻瘰癧身熱方

猪椒 二十斤

右一味以水淹足煎熟去滓置瓶中覆瓶口以瘡當上熏候熱極乃止痛膿血鼠當從瘡出便愈

又寒熱鼠瘻瘰癧散方

貍骨 炙　龍骨 各五分　蜀椒 熬半兩　鼠粘子

當歸　王不留行　土瓜根 各一兩

右七味擣合篩先食酒服方寸匕日再夜一出並第四十二卷中

集驗療鼠瘻及瘰癧膏方

白馬牛羊猪雞等矢屑 各一斤

漏蘆　藁本 各二斤

右七味並於石上燒作灰研絹篩之以猪脂一升三合煎亂髮一兩半令沸髮盡乃內諸藥屑微火上煎五六沸藥成先去瘡上痂以鹽湯洗新綿拭瘡令燥然後傅膏若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛覆無令風冷神驗瘰癧以膏傅上亦日再古今錄驗范汪同

又療寒熱瘰癧散方

白曾青 半兩　當歸　防風　括樓根

芎藭　黃耆　貍骨 炙　甘草 炙各二兩

細辛　乾薑　露蜂房 炙各一兩　礜石 燒半日

大附子 炮　荏子 各半兩　斑猫 去首足翅熬　芫青 去首足翅各五枚熬

右十六味擣下篩為散以酒服一錢匕日再忌猪肉冷水海藻菘菜古今錄驗范汪同並出第八卷中

又療鼠瘻方

靜嘉堂文庫所藏

蛇腹中鼠蝦蟇燒末酒服方寸匕甚効

又方

以槲葉擣末傅腫上熱炒鹽熨之即消良効並出第五卷中

毒腫瘰癧方四首

崔氏大五香湯療毒氣苦肌肉中腫痛結脉寒熱如瘰癧痛不可近急者數日殺人苦心煩悶便當急速與湯并以滓薄腫脉上方

青木香　雞舌香　沈香　升麻(各五分)

藿香　犀角(屑)　吴茱萸　桂心

麻黄　甘草(炙各三分)　薫陸香(四分)　細辛(二分)

右十二味㕮咀以水七升煑取二升八分三服不差復合若嗇嗇惡寒加附子中形者一枚炮令坼八破用忌生冷菘菜海藻豬肉冷水生菜五辛古今録驗同

又五香湯療毒腫瘰癧方

麝香(研)　青木香　雞舌香　藿香

薫陸香　當歸　黄芩　升麻

芒消(各三分)　大黄(五分)

右十味㕮咀以水六升煑取二升去滓内消分二服相去如人行七八里一再服諸卒尸注惡氣亦療出第五卷中

經心録射干湯療惡毒身強痛瘰癧方

射干　桂心(各二兩)　麻黄(去節)　生薑

甘草(炙各四兩)　杏人(四十枚去皮尖)

右六味切以水四升煑取三升去滓分三服忌海藻菘菜出第五卷中

又升麻湯療風毒咽水不下及瘰癧腫方

靜嘉堂文庫所藏

升麻　芍藥各四兩　射干三兩　杏人去尖皮三兩

麻黃去節二兩　甘草炙二兩　楓香　葛根各三兩

右八味切以水八升煎取半分三服忌海藻菘菜出第三卷中

○灸瘰癧法六首

千金灸瘰癧法

兩腋中患瘰癧處宛宛中百壯止

又法

擣生章陸根捻作餅子置漏上以艾炷灸餅子上乾熟易之灸三四炷

又法　灸五里大迎各三十壯

又法

葶藶二合　豉一升

右二味合擣令極熟作餅如大錢厚二分許取一枚當瘡孔上作艾炷如小指大灸餅上三壯一日易三餅九炷隔三日一灸[illegible]同古今錄驗兼主瘻不可灸頭瘡葶藶氣入腦殺人劉涓子同

又法

一切瘰癧在項上及觸處但有肉結凝以作瘻瘡及癰癤者以獨頭蒜截兩頭却心作孔大艾炷勝蒜大小貼瘰子上灸之勿令上破肉但取熱而已七炷一易蒜日三易日日灸之取消止翼同

又方

七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合擣作炷灸瘰子一百壯並出第二十四卷中

九瘻方三十五首

廣濟療瘻有九種不過此方

靜嘉堂文庫所藏

芫青 [illegible] 海藻 洗八分 昆布 洗八分 雄黃 研八分
狸骨 炙三分 牡蠣 熬四分 地膽 熬二十枚 青木香 三分
右八味搗篩爲散酒服一錢匕日二服病從小便出如爛筋
忌生冷粘食猪魚肉陳臭物 出第五卷中
劉消子療鼠瘻方
死蜣蜋 燒二枚
右一味苦酒和塗之數過即愈先以鹽湯洗 古今錄驗千
金同
又方
五月五日樓桃搗末先鹽湯洗拭之令乾以末傅
瘡上 樓桃未詳
又方
烏頭 炮 附子 炮各二兩

右二味㕮咀著五升淳苦酒中漬之待乾復内苦酒中燥
復内以苦酒盡暴令乾擣末酒服方寸匕日三忌猪肉冷
水等
又張子仁療鼠瘻要方
柞木皮 五升
右一味以水一斗煑熟去皮煎令汁得二升稍稍服盡當有
宿肉出即愈 備急文仲古今錄驗同並出第六卷中
肘後療若鼻内肉外查瘤膿血出者[illegible]蜂瘻方
取蜂房火炙[illegible]末酒服[illegible]寸匕日一
深師療鼠瘻方
[illegible]鱺魚一[illegible]
[illegible]参[illegible] [illegible]五月五日[illegible]
臘月猪脂[illegible]

右七味擣篩猪皮下[illegible]令[illegible]骨內[illegible]鱣魚皮青黃[illegible]
擣千杵平旦未食服如梧桐子三[illegible]丸[illegible]當[illegible]寒熱不覺暮[illegible]長明
日旦起更服三丸稍稍增之[illegible]食頃[illegible]殺人蟲當從
小便出以甘器盛之尿[illegible]乃有白[illegible]蟲見[illegible]不可以見亦大便出此
方驗服藥一百日要令忌[illegible]猪肉[illegible]等

又方

馬齒礬石燒　真珠粉

右二味擣下篩為散厚塗瘡上不過三愈

又方

松脂　硫黃　狼毒各二兩

猪腦一具　白斂二兩

右五味熬猪腦取汁狼毒白斂㕮咀以水三升煑取一升內
腦汁中煎令得五合細末硫黃松脂下篩內中攪令相

一得綿裹內瘡中七日知一七日病除神良

集驗凡有九種瘻

一曰狼瘻始發於頸頭腫有根起於缺盆上轉連耳本種大
此得之因憂恚氣上不得下其根在肺空青主之商陸為佐
二曰鼠瘻始發於頸無頭尾如鼷鼠瘻核時上時下使人寒熱
脫肉此得之由食大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母為佐
三曰螻蛄瘻始發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黃得
之食瓜螻蛄餘毒及果實不去核其根在大腸荏子主之桔梗為
佐
四曰蜂瘻始發於頸瘰癧三四處俱腫起相連潰潰移此得之
多飲流水水有蜂餘毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為佐
五曰蚍蜉瘻始發於頸初得之如傷寒此得之因飲食中有蚍蜉
毒不去其根在腎礜石主之防風為佐

靜嘉堂文庫所藏

六曰蠐螬瘻始發於頸上下無頭尾如棗核塊𡎺多在皮中使人寒熱心痛滿此因喜怒哭泣得之其根在心礬石主之白术爲佐

七曰浮疽瘻始發於頸如兩指使人寒熱欲卧此得之因思慮憂[illegible]其根本膽地膽主之甘草爲佐

八曰瘰癧瘻始發於頸有根初苦痛瘰癧覺之使人寒熱得之新沐頭濕結髮汗流入於頸所致其根在腎雌黃主之芍藥爲佐

九曰轉脉瘻始發於頸如大豆浮在脉中濯濯脉轉苦驚惕身如振寒熱始得之時驚卧失枕其根在小腸斑猫主之白芷爲佐

療瘻九種方

空青（研之） 商陸根 狸骨（炙） 知母
茬子 桔梗 雄黃 黄芩
礜石（燒） 防風 礬石（燒汁盡） 地膽（熬）
白术 甘草（炙） 雌黃 芍藥
斑猫（去足羽熬） 白芷（各二分）

右十八味擣其論病者特加其分餘種令分等細篩末空青最在後内之苦酒服一刀圭日三服三十日知五十日愈七十日平復病者百日禁食魚肉忌生菜桃李雀肉海藻菘菜犬肉生血物餘無所忌二大豆爲一刀圭小兒服之半大人全服八歲以下寧從少起過度令人淋瀝即減之出第九卷中

千金問曰何謂九瘻荅曰一曰狼瘻二曰鼠瘻三曰螻蛄瘻四曰蜂瘻五曰蚍蜉瘻六曰蠐螬瘻七曰浮沮瘻八曰瘰癧瘻九曰轉脉瘻謂之九瘻

又療狼瘻發於頸頭腫有根起於缺盆上[illegible]連延耳根腫大此得之因憂恚氣上不得下其根在肺空青主之商陸爲佐方

空青（研二分） 蝟腦（二分乾之） 獨活（[illegible]） 蝟肝（一具乾之）

芎藭半兩　女婦草一分　黄芩　鼈甲炙一
斑猫去足翅　乾薑　當歸　茴香
礬石燒　地膽各一　蜀椒三十枚
右十五味作散下篩酒服方寸匕日三十五日即止忌生血物莧菜
劉涓子古今録驗同
又療鼠瘻發於頸無頭尾如鼷鼠使人寒熱此得之由食大鼠餘
毒不去其根在胃狸骨主之知母爲佐方
陵鯉甲炙　山龜殼炙　甘草炙　桂心
雄黄　乾薑等分
右六味作散下篩服方寸匕日三蜜和内瘡中無不愈先灸作
瘡後與藥良忌海藻生葱劉涓子備急古今録驗文仲同
又療鼠瘻瘡差復發及不愈出膿血不止方
以不中水猪脂㕮咀生地黄内脂中令其脂與地黄足相淹
和煎六七沸去滓桑灰汁淨洗瘡去惡汁以地黄膏塗上
日一易范汪同
又療鼠瘻方
得蛇虺所吞口中鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗
難過耳并傅瘡中范汪同
又療鼠瘻方
死鼠一枚中形者　亂髮如雞子一枚
右二物以臘月猪膏令淹鼠髮煎之令其鼠髮都盡消膏成
分作二分一分稍稍塗瘡一分以酒服之即愈矣鼠子當從瘡出
神良秘不傳翼備急文仲集驗范汪同
又療螻蛄瘻發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黄此得之
食瓜螻蛄餘毒及果實不去核其根在大腸荏子主之桔梗爲佐方
桂心　乾薑　桔梗二　礬石燒

靜嘉堂文庫所藏

獨活（各一分）　附子（一分炮）　椒（一百粒汗）　芎藭（半分）
龍骨（半分）　茬子（一分）
右十味擣下篩棗二十枚合擣以酢漿丸如大豆溫漿下五丸
忌猪肉冷水生葱生菜古今錄驗劉涓子同
又方
槲葉灰先以泔清煑槲葉取汁洗拭乾内灰瘡中
又療蜂瘻發於頸瘰癧三四處俱腫起相連潰潰移此得之飲流
水有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為佐方
蜂房（一具炙）　鼈甲（一分炙）　茴香（一分）　吳茱萸（二分）
椒（一百粒汗）　乾薑（一分）
右六味擣下篩作散傅瘡孔中日十度十日止忌莧菜
又療蜂瘻初生時狀如桃而痒搔之則引大如雞子如覆手者方
熬鹽熨之三宿四日不差至百日成瘻其狀大如四五寸

又廣三寸中生蜂作孔乃有數百治法以石硫黃隨多少
然燭燒令汁出著瘡孔中須臾皮中見蜂數十唯蜂盡
即差
又療蚍蜉瘻發於頸初得如傷寒此因食中有蚍蜉毒不去其根
在腎礜石主之防風為佐方
桃白皮（一分正且取）　白朮（四分）　知母　雌黃
乾地黃　獨活　青黛　斑猫（去首羽足熬）
白芷　柏脂　芍藥　海藻（一云海苔）
當歸（各一分）　蝟皮（四分炙）　椒（一百粒去汗）
右十五味擣下篩作散服一錢匕日三忌桃李雀肉蕪荑等劉
涓子古今錄驗同
又療蠐螬瘻發於頸無頭尾如棗核塊塊多在皮中使人寒熱心
痛滿此因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮為佐方

靜嘉堂文庫所藏

白朮一分　礬石一分　空青（兩三分）　當歸二分
細辛一分　蝟肉炙　枸杞根　斑猫（去翅足熬）
地膽（各一分熬）　乾烏腦（三大豆）
右十味擣下篩散服方寸匕日三酢漿服之忌生菜桃李雀肉生血
物等病在上側輸臥在下高枕臥使藥流下劉涓子古今録驗同
七日浮沮瘻發於頸如兩指使人寒熱欲臥得之因思慮憂憶其根
在膽地膽主之甘草爲佐方
雄黄一分　乾薑一分　龍膽（二分一作龍骨）　石決明
續斷　菴䕡子根（各一分）　細辛二分　大黄半分
地膽（一分熬）
右九味擣下篩爲散傅瘡日四五忌生菜劉涓子同古今録驗
無雄黄有硫黄餘同
又療瘰癧瘻發於頸有根初苦痛歴歴覺之使人寒熱此得之
新沐頭濕髮汗流入於頸其根在腎雌黄主之芍藥爲佐方
茯苓　續斷　礬石（燒令汁盡）　乾薑
雌黄　芍藥　桔梗　椒（汗）
乾地黄　常山　空青　狸肉
烏腦（并腎肝）　斑猫（去翅足熬）　虎指（各一分一云虎腎）　附子（一兩炮）
礜石（二分燒半日）
右十七味擣篩爲散蜜丸如大豆夜酒服十九日三忌猪肉冷水生
葱生菜生血物蕪荑酢物古今録驗同
又療轉脉瘻發於頸如大豆浮在脉中濯濯脉轉苦驚惕身如
振寒熱得之於驚臥失枕其根在小腸斑猫主之白芷爲佐方
緑青二分　礜石（半分燒半日）　防風一分　甘草（半分炙）
大黄二分　桂心二分　人參二分　當歸二分
升麻一分　地膽（一分熬）　白朮一分　鍾乳（一分研）

靜嘉堂文庫所藏

斑猫一分去翅足熬 白芷一分 續斷一分 麝香一分

麥門冬一分去心

右十七味擣下篩蜜丸酒服如大豆十丸日三勿食倉米慎房百日忌海藻菘菜桃李雀肉生葱劉涓子古今錄驗同並出第二十四卷中

崔氏療九種瘻方

芫青二十枚去足翅熬 地膽十枚去足羽熬 斑猫三十枚準上

蜈蚣一枚肥大者折取一寸半微火熬 大豆黃一百枚生用 生犀如棗核大 牛黃棗核大

豉心四十九粒

右八味擣篩蜜丸如梧子初欲服藥少夜食明旦飲服二丸須臾可煮酢漿薄粥稍稍冷飲之其瘻蟲有形狀皆從小便出至日西甚虛悶可煮湯飡蔓菁菜羹醬食之自餘脂膩醋脯一名口味五辛果子之類並不得食人強隔日一服人弱兩三日一服服藥以瘡差蟲盡爲度若差仍作二十日許將息藥欲盡豫合勿使斷絕藥氣不能將息便不須服忌猪肉冷水救急千金同出第五卷中

張文仲療鼠瘻方

石南 生地黃 雌黃

茯苓 黃連各二兩

右五味作散傅瘡日再忌猪肉蕪荑大驗備急同

又療鼠瘻諸惡瘡方

苦參三斤 露蜂五兩 麴二升

右三味以水三斗漬藥三宿去滓黍米二升釀熟飲日三一方得蝟皮一具劉涓子同並出第五卷中

備急劉涓子鼠瘻方

山龜殼炙 桂心 雄黃

乾薑 狸骨炙 甘草炙

靜嘉堂文庫所藏

右六味等分擣篩爲散飲服方寸匕日三蜜和內瘡中無不愈先
灸作瘡後與藥良忌生葱海藻菘菜

又方

礬石三分燒　斑猫一分去首足羽熬

右二味擣下篩用酢漿服半匕須臾瘻蟲從小便出刪繁文仲同

出第五卷中

古今錄驗療鼠瘻麝香塗方

麝香研　雌黃研

右二味等分並爲散取蝦蟇背白汁和塗瘡孔中日一度

又療鼠瘻著頭生小者如杏大者如杯方

斑猫一分去首足羽熬　牡蠣二分熬　海藻四分洗去鹹味

右三味擣下篩酒服五分匕日三病當從小便出如魚胞忌蒜並

出第四十一卷中

諸瘻方一十五首

劉涓子瘻腫病方

斑猫四十枚去足翅熬　桂心四分　芫青十枚去足翅熬　葛上亭長三十枚熬

右四味擣下篩酒服半錢匕日一忌生葱

又療瘻方

斑猫四十枚去足羽熬　地膽三十枚去首足翅熬　蜥蜴三枚炙

右三味擣之千杵蜜和如大豆服二丸

又療瘻衆方不差効驗方

牡蒙一兩

右一味擣之湯和適寒溫取一升許薄瘡上泠易經宿佳

又療瘻生肉膏方

桑薪灰三升水四升淋之復重淋之取三升石灰熬
令黃內灰汁中以兩重帛裹絞去滓更魚目煎取二

靜嘉堂文庫所藏

升勿用急火煎隨瘻孔深淺初時作服散而差孔若深四寸新藥與孔裏薤白使濡安藥薤白入藥孔裏若深四寸隨瘻根而灸兩處每處與四十壯唯勿灸瘻孔隨深淺去膿散與膏安著瘡孔裏十五過少遷延日月取差肉滿膿亦斷神良無比出第六卷中

肘後論此本在諸方瘡條中病類既多今狀出爲別一篇凡瘻病有鼠蛇蜂蛙蚓類似而小異皆從飲食中得其精氣入人肌體變化成形瘡既穿潰浸諸經脉則亦殺人而鼠蟻最多以其間近人故也

通治諸瘻方

以八月中多取斑猫蟲即内苦酒中半日許出暴乾使十取六七枚著銅器中微火上遥熬令熟擣作屑巴豆一粒去皮熬之又拔取黄犬背上毛二七枚

亦熬作屑好朱以錢五分匕都合和以苦酒頓服之蟲當盡出若一服未効先時可預作三兩劑後日服遠不過三兩劑

又方

斑猫一枚一方云三分去頭足翅熬　杜蘅　枳根　酸棗根
虎薊根　猫薊根各一把

右六味擣蜜丸日一服如棗一枚以小丸著瘡中

又方

若先著下部邊或上出耳後頸項諸處者苦參切五升以苦酒一斗漬三四日宜服一升亦加之但多作以知爲度不過三四度必差

又療瘻方

槲木皮長一尺闊六寸去黒皮細切以水一斗煑取

靜嘉堂文庫所藏

五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器接
吐出看視之病矣

又方

新生兒矢一百日以來皆收置密器中五十六十日
取塗瘡孔中

又方

鯉魚腸切作五段火上煖之洗瘡拭乾以腸封之冷
即易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差

崔氏療瘻方

槲白皮 切取五升

右一味以水八升煮令泣泣絞去滓重煎令成膏日服半
棗漸加至一棗許亦著瘡上無忌患瘡唯宜煮飯苜蓿醬
醬又不得多食之出第五卷中

備急療瘻生肉膏方

楝白皮二兩 鼠肉二兩 薤白三兩 當歸二兩
生地黃五兩

右五味以臘月猪膏三升煎薤白黃色膏成傅瘡孔上令生
肉肘後文仲同

又葛氏云若著口裏方

楝大東引根切

右一味水煮取濃汁含之數吐勿咽肘後同並出第五卷中

備急療諸瘻方

取葶藶子擣細羅取好白蜜和丸每欲著藥先溫湯
洗著瘡孔中以丸內之若塞以物道開日三度瘡瘥
是差候勿停藥大効出第五卷中

必効療諸瘻方

靜嘉堂文庫所藏

先以泔清温水以綿拭之取葵葉微火煖貼之癒引
膿不過三二百葉膿盡出即肉生忌雜諸魚蒜房室
王丞頻用大奇効

腋臭方三十七首

病源人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸之氣者故謂之狐
臭此皆血氣不和蘊積故氣臭出第三十一卷中

肘後療人體及腋下狀如狐犼思晉切小獸也氣世謂之胡臭方二
炊甑飯及熱丸以拭腋下臭仍與犬食之七日一易

此即差文仲備急同

又方
煮雞子兩枚熟去殼及熱各內腋下冷弃之三路口
勿反顧三爲之文仲備急並同

又方

燒好礬石末絹囊盛之常以粉腋下不過十度小品
集驗文仲備急同

又方
青木香二兩 附子一兩 礬石半兩燒 白灰一兩半
右四味細末著粉腋下汗出因以粉之亦差

又方
青木香一斤 石灰半斤熬
右二味常以粉身亦差並擣末傅之

又方
乾薑 胡粉 白灰等分
右三味合作末粉之范汪同並出第五卷中
千金療胡臭漏腋有天生胡臭有爲人所染臭者天生者難療
爲人所染者易差然須五年傅白礬散勿止并服五香丸乃可

靜嘉堂文庫所藏

得差勿言一度傅藥即差止可傅藥時暫得一度差耳凡胡臭
人通忌食芸臺五辛療之終身不差胡臭方

辛夷　芎藭　細辛　杜蘅
藁本各二分

右五味㕮咀以苦酒漬之一宿煎三日取汁傅之欲傅臨時以差爲度小品集驗必効范汪同

五香丸主口臭及身臭止腫痛散血氣方

豆蔻子　丁香　藿香　白芷
青木香　當歸　桂心各一兩　零陵香一兩
甘菘香二分　香附子二兩　檳榔人二枚

右十二味擣下篩蜜丸如大豆日三夜一時含之咽津五日內口香十日身香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日靜洗手水落地香五七日把他人手亦香禁五辛下氣去臭

第一出第六卷中

又石灰散主胡臭方

青木香　楓香　丁香　薰陸香各二兩
陽起石　橘皮各三兩　礬石四兩用燒　石灰一升熬

右八味擣下篩以綿作篆子麤麤如四指長四寸展取藥著上即以絹囊盛之繫著臂先以布揩指令痛然夾之

又方　水銀胡粉面脂研和傅之大驗救急同

又方

辛夷　細辛　芎藭　青木香

右四味等分擣下篩作散熏畢粉之

又方　伏龍肝作泥傅之良

又方　牛脂和胡粉三合煎令可丸塗腋下一宿即愈集驗同

靜嘉堂文庫所藏

又方　三年苦酒和石灰傅之

又方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易差止

又方

附子炮　石灰熬　青木香三兩　礬石三分燒

米粉一升

右五味擣篩常粉之

又方

馬齒草一束

右一味擣碎以蜜和作團以紙裹之以泥糊厚半寸暴乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令冷先以生布揩之夾藥腋下痛久忍不能得然後以手中勒兩臂差出第二十五

卷中

崔氏療胡臭有効方

先用泔清淨洗又用清酢漿水淨洗訖微揩使破取銅屑和醶酢熱揩之不過三四度差

又方

胡粉　銅青

右二味等分研以人乳和塗腋下若成瘡且停瘡差又塗以差爲度出第四卷中

張文仲療胡臭若股内陰下常汗濕且臭或作瘡者方

但以胡粉一物粉之即差常用大驗備急同

又隱居効驗胡臭方

雞舌香　藿香　青木香　胡粉各二兩

右四味擣散作粉綿裹内腋下常傳即差備急同出第七卷中

靜嘉堂文庫所藏

救急療腋臭方

銅屑一升 石灰三子熬

右二味合和橐盛粉之有汗便粉之

又方

甘草炙 松根白皮 甘瓜子 大棗各四分

右四味為散食後服方寸匕日三出第三卷中

又方

雞矢 白礬石熬令汁盡 黃礬熬 附子炮

木蘭皮 青木香各一大兩

右六味擣為散粉之又石龍衣一大兩蛇蛻皮是也以子日夜半燒為灰服之

又方

常以鹽緑和醶酢塗之一遍一年再塗水除以胡粉和水銀和令相入塗腋下十日以來無氣出第八卷中

又方

黃礬 細辛 芎藭各二兩 雄黃一兩

右四味擣下篩為散先以泔清洗腋拔去毛令血出以粉之腋下出第九卷中

必効療腋臭方

好硇砂二兩 好白礬熬 蜜陀僧各三兩 酢酪二兩干去

胡粉二分 金屑八分 鈆錫 生銅屑各二分

右八味並研令細酢一升新銅器中盛藥密封其日二七日看上青緑色鬱鬱然其藥即成還須研令極細至用時若乾更以好酢和藥以塗病處若有毛先板去以石灰水淨洗拭使乾以生布揩令微赤可作瘡一日一塗洗遠不過十日即待腋瘡差訖更取銅屑細研成粉塗病處日五六即止病

靜嘉堂文庫所藏

差終身不得帶麝香食胡荽

又方

取五月五日承露百草陰乾火燒爲灰用井華水和灰爲團重火錬如熛灰色錬訖即以釅酢和爲餅厚如掌大小徑二以來即於兩腋下挾即易爽時一身連頭並悶二日後若病不差復著藥微發亦不甚臭還依法療之永斷

又金錯屑塗法

金錯屑一銖 銀錯屑一兩 赤銅屑 香附子

胡粉一 錢錯屑各一兩 三年醋三升

右七味以羊酪一升於銅器中煑得二沸以用塗之

又方

三年釅酢二升 碎銅一斤 鹽半合 灰二合

右四味浸藥攪藥色青即塗腋下日三四塗三日小愈一月全差

又方

大銅錢二七文 白梅二七个 鹽一升

右三味以五月五日水一升共置瓶子裹挂户上百日畢可取用塗不得婦人爲塗藥食粘食蒜發

又方

以酢五合內銅器中以錢十四文胡粉五銖置中泥頭七日後以粉十銖和之訖去腋下毛日再傅之合藥勿令人見祕之

又方

以首子男兒乳汁浸鹽研銅青拔去毛使血出塗差

又方

釅醋浸青木香置腋下夾之即愈

靜嘉堂文庫所藏

又方

錢三七文　胡粉三兩　馬齒草鹿莖三兩　青木香二兩

大酢半升

右五味切先以醋漬錢五六日然後總漬諸藥一物煮五六沸置磁器中先以石灰汁洗病處拭乾訖塗之以差爲度並出第三卷中

古今録驗療胡臭青羊脂粉方

胡粉　銅青等分

右二味先以鹽湯洗兩腋下及著藥且淋洗又以青羊脂和傅數日差

又錢汁傳方

錢二七文

右以礦石磨令平以夾腋下神良范汪同並出第三十卷中

漏腋方三首

病源腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是氣血不和爲風邪所搏津液蘊瘀故令濕臭出第三十一卷中

集驗療漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕致臭六物胡粉傳方

乾枸杞根半兩　胡粉一兩　乾商陸根一兩

乾薔薇根半兩　甘草半兩炙　滑石一兩

右藥擣下篩以苦酒和塗腋下當微汗出易衣復塗著藥不過三傳便愈或更發復塗之不可多傳傷人腋餘處亦塗之小品文仲備急范汪同出第九卷中

經心録漏腋方

正朝且以小便洗文仲備急集驗小品范汪千金同

又方

靜嘉堂文庫所藏

擣馬齒草腋下夾之令燥後復易之先用雌黃石灰
等分合水煎一兩沸如泥泥之毛落然塗諸藥良並
出第五卷中

七孔臭氣方三首

千金療面目口齒七孔臭方

沈香五兩 甘草二兩炙 白瓜瓣半升 芎藭二兩
丁香五兩 藁本二兩 麝香二兩 當歸二兩

右八味擣下篩蜜丸食後含如小豆五粒日三秘不傳久服
令人舉體皆香救急同出第六卷中

救急療人七孔臭氣方

甘草五分炙 芎藭四分 白芷三分

右三味作散下篩食後飲服方寸匕日三

又方

瓜子一分 芎藭 藁本 當歸
杜蘅各一兩 細辛二分 防風一分

右七味擣下篩食後溫水服方寸匕日三

令人體香方四首

肘後令人體香方

白芷 薰草 杜若 杜蘅
藁本等分

右五味末之蜜和旦服如梧子三丸暮服四丸三十日足下
悉香文仲備急范汪同

又方

甘草炙 瓜子 大棗 松根皮等分

右四味擣下篩食後服方寸匕日三二十日覺効五十日身
體並香百日衣服床幃悉香文仲備急范汪千金同

靜嘉堂文庫所藏

又方

瓜子　芎藭　藁本　當歸

杜衡　細辛(各三分)　白芷　桂心(各五分)

甘草(二分炙)

右九味擣下篩食後服方寸匕日三五日口香二十日肉香

文仲備急同出第五卷中

千金療諸身體臭方

竹葉(十兩)　桃白皮(四兩)

右二味以水一石二斗煑取五斗浴即香出第六卷中

雜療汗出不止方二十首

集驗療止汗粉藥方

牡蠣(二兩熬)　附子(半兩炮)　麻黃根(二兩)

右三味擣篩以白粉一升和合粉汗汗止忌猪肉

又汗後遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝

加附子湯方

大棗(十三枚擘)　附子(一枚大者炮去皮破八片)　桂心(三兩)　芍藥(三兩)

生薑(三兩)　甘草(二兩炙)

右六味切以水七升煑取三升溫服一升忌猪肉冷水海藻

菘菜生葱延年同(此本張仲景傷寒論方)

千金止汗方

青松葉(一斤)

右一味擣令汁出清酒一升漬二宿近火一宿初服半升漸

至一升頭面汗即止出第八卷中

延年澤瀉湯療大虛煩躁止汗治氣方

澤瀉　茯苓(各二兩)　牡蠣(熬)　白朮(各一兩)

生薑(半升)

靜嘉堂文庫所藏

右五味切以水八升煮取二升分服一升日再服忌桃李雀
肉酢物等

又都梁散療汗出如水及汗出衂血吐血小便血殆死方

都梁香二兩　紫菀　人參　青竹茹
蓯蓉各一兩　乾地黃二兩熬令燥

右六味擣下篩水服方寸匕不効須臾再服忌蕪荑

又療大病之後虛汗不可止方

杜仲　牡蠣熬等分

右二味擣下篩向暮臥以水服一錢匕午前汗止者不再服
服之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再必愈有驗天
行及百病後虛吸漏汗遂溫之無不止者

又療大病後虛汗出不禁者方

粢粉　豉等分熬炒　故竹扇如手掌大燒取灰

右三味合擣以絹囊盛粉[illegible]立止最驗當先熬末粉之千金
並同

又粉散療大病後身體虛腫汗出止汗方

麻黃根三兩　防風　乾薑　細辛各二兩
白斂一兩

右五味合下篩以粢粉五升熬令黃合和以粉身忌生菜出
第十一卷中

古今錄驗療汗出不止朮桂散方

麻黃　桂心各五分　白朮　附子炮
昌蒲各三分

右五味擣末酒服方寸匕日三未食服忌羊肉餳猪肉桃李
雀肉等

又止汗熱雷丸散方

靜嘉堂文庫所藏

雷丸　桂心　牡蠣各五分熬

右三味擣下篩粉身日三忌生葱出第二十六卷中

外臺秘要方卷第二十三

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元校正

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

靜嘉堂文庫所藏

外臺秘要方卷第二十四 癰疽發背九門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

癰疽方一十四首

癰腫方二十五首

石癰方五首

癰癤方一十四首

附骨疽方七首

瘭疽方一十六首

緩疽方四首

發背方四十首

癰疽發背雜療方二十六首

癰疽方一十四首

集驗癰疽論黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯荅曰榮衛稽

靜嘉堂文庫所藏

留於經脉之中則血泣而不行不行則衛氣從之從之而不通
壅遏不得行故曰熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不
能陷肌膚於骨髓骨髓不為焦枯五藏不為傷故命曰癰黄帝
曰何謂疽岐伯荅曰熱氣純盛下陷肌膚筋髓骨肉内連五藏
血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者其上皮
夭瘀以堅亦如牛領之皮癰者其上皮薄以澤此其候黄帝曰
並出太素第十六卷中
經言五藏不調致疽六腑不和生癰一曰熛疽急者二三日殺
人緩者十餘日殺人二曰癰疽急者十餘日殺人緩者一月死
三曰緩疽急者一年殺人緩者數年四曰水疽所發多在手
足數年猶可療疽者數十種要如此于氏法癰之疾所發緩
地不殺人所發若在險地宜令即外消若至小膿猶可療大
膿致禍矣

一爲腦户　二爲舌本　三爲玄癰　四爲喉節
五爲胡脉　六爲五藏俞　七爲五藏繫　八爲兩乳
九爲心鳩尾　十爲兩手魚　十一爲腸屈之間　十二爲小道之後
十三爲九孔　十四爲兩腨腸　十五爲神主之舍（一本云主客之舍）
凡十五處不可傷而况於癰乎若癰發此地遇良醫能不及
大膿者可救至大膿害及矣范汪同
候賊風證但夜痛應骨不可按抑不得廻轉痛處不壯熱體亦
不作寒乍熱但覺體瘵瘮然冷欲得熱熨痛處即小寛時
有汗此是賊風證也宜即得針灸服療風藥溫也（方在療風候上大論宜知二候如此證）
又初得附骨疽即服漏蘆湯下之傅小豆薄得消也
又下利已腫處未消者可除大黄用生地黄及乾地黄隨時也
熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯除大黄餘熱未消可傅
升麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散如療癰法又有膿

靜嘉堂文庫所藏

尖恐切下同疾喜著四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯熱其發於脚
者喜從踹踵起至踝赤如編繩謂之牖病也又其發於臂者喜
腋下起至掌也皆由四肢勞熱氣盛爲凉濕所折風結筋中成
此疾也不即療取消潰去膿則筋攣縮也其者但置不消復不潰
其熱歇氣不散喜變作牖也
又療之宜服漏蘆湯令下外以鋒針針去血氣針寫上結脉處
傅小豆薄則消也皆可依療丹法消之及潰成膿出火針傅膏
散如療癰法也
又亦用甘蕉根薄之善
又癰發腫高者疹源淺腫下者疹源深大熱者易療小熱者難
療初便大痛傷肌晚乃大痛傷骨都堅者未有膿半堅半軟者有
膿發腫都軟血瘤也非癰發腫以漸知長引日月亦不大熱時
時牽痛瘤也非癰長音曰謂諸氣結亦有腫久久不消成癰療

之宜散氣氣已散若初腫處有浮氣年衰皆發癰療之宜及
年盛幷折散熱可無此憂
于氏法夫癰疽脉洪麤難療脉微濇者易療諸浮數之脉應
當發熱而反惡寒者癰也此或附骨以有膿也
趙乃言無虛勞腹中疾或發血瘤瘡瘡狀墳父吻切起頭黒正兩
置不當灸療療之火熨便焦爛剥刮去焦痂則血泄不可禁必
死癰起於節解遇頑醫不能即消令至大膿者豈膏藥可
得復生乎
又發癰堅如石走皮中無根瘰癧也久不消因得他熱之疾時
有發爲癰也
又發癰至堅而有根者名爲石癰療之法當服也非酒即藥勢
不宣但當稍飲取令相得和散便止凡癰腫有肥人用貼宜栝樓
根和平體宜赤小豆貼方

靜嘉堂文庫所藏

以赤小豆五合內苦酒中熬之畢擣爲散以苦酒和
之塗抵紙上貼腫從發腫兩頭以下范汪同
又論少小有渴年四十以外多發癰疽有膈痰而渴者年盛必作
黃疽年衰必發癰疽也范汪同
又黃帝曰願聞癰疽之形與其期日岐伯曰略說癰疽之極者
十八種
又癰疽發咽名曰猛疽猛疽不療則血化爲膿膿不寫塞咽
半日死其化膿者寫已則含豕膏無令食三日而已一云無食
又發於股胻名曰股脫疽其狀不甚變而癰腫膿搏骨不急療
三十日死 髀內曰股股外曰髀膝上股下骨稱曰股胻也
又發於脇名曰改訾訾者女子之疾也久之其狀大癰膿其中乃
有生肉大如赤小豆療之方
剉連翹草及根各一升以水一斗六升煑令竭取三
升即強飲厚衣坐釜上令汗出至足已
又發於尻者名曰兊疽其狀赤堅大急療之不療三十日死
又發於脛者名曰兔囓其狀赤至骨急療之不療害人
又發於足上下者名曰四淫其狀大如癰不急療百日死
又發於肩及臑者名曰疵疽其狀赤黑急療之此令人汗出至
足不害五藏癰發四五日逆焫之
上灸百壯石子當碎出也不出可益壯從癰發高下以後范汪
並同
又石癰者始發皮核相親著不赤頭不甚堅微痛熱熱漸自歇
便堅如石故謂之石癰難消又不可得自熟縱愈皆百餘日
又發癰兩頭牽而傍推無根者又不痛結筋非癰也發癰狀如
發雖極大此肉瘤非癰也腫一寸至三寸癤也三寸至五寸癰也
五寸至一尺癰疽也一尺至三尺名曰竟體癰疽癰成膿九孔皆出

靜嘉堂文庫所藏

諸氣憤鬱不遂志欲者多發此疾癰及疽血瘤晁乳石癰結癰
瘰癧皆不可就針角針角少不及禍者
凡癰疽之疾未見膿易療之當上灸三百壯四邊間子灸各二
百壯實者可下之虛者可補之有氣者下其氣服占斯內塞散
得愈絕房三年凡癰瘡審知膿者破之皆當近下邊膿出後當
膏藥灸之常使開潤勿令燥合也若其人羸勿一頓盡膿徐
徐令後稍出乃盡癰方潰其上皮薄人喜當上破之此終不愈
當下破之乃得膿耳勿要其皮厚也凡癰有膿當破無膿但氣
腫若有血慎不可破針灸也按之四邊堅中軟此爲有膿瀋也
一邊軟亦有膿都堅者此爲菹核或但有氣也都軟者此爲有
血血瘤也當審堅軟虛實爲要若堅菹積久後若更變熟偏
有軟處當軟之不可破者當溫暖裹實耳若灸刺破療必暴劇
不可救及結筋瘤脈瘤 [illegible] 內晁乳皆不當療也又服內塞散不與他療

相害晝夜十餘度服散當以酒
又發於腋下堅赤者名曰米疽療之用砭石欲細而長疎啓之 [illegible]
以豕膏六日已勿裹其癰堅而不潰者爲馬刀挾纓急療之 [illegible]
頭前日纏
又發於股陰者名曰赤弛不急療六日死在兩股之內不可療
一云六十日死
又發於膝者名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石之
死須其柔色異乃石之者生 [illegible]
又諸癰腫之發於節而相應者不可療 [illegible] 八節
又發於陽者百日死
又發於陰者三十日死 丈夫陽器曰陽婦人陰器曰陰
又發於踝者名曰走緩其狀肉色不變數石其輸數而止其
寒熱不死

靜嘉堂文庫所藏

又發於足傍者名曰厲疽其狀不大初從小指發急療之去其
黑者不消輒益不療百日死[illegible]
又發於胷者名曰井疽狀如大豆三四日起不早療下入腹入
腹不療十日死[illegible]
又發於足指者名曰脫疽其狀赤黑死不療不赤黑可療療不
衰急斬去之得活不去者死
又發於膺者名曰舌疽其狀如穀實瓜蔞常苦寒熱急療
之去其寒熱不療十歲死死後出膿
又發於頸者名曰夭疽其狀大而赤黑不急療則熱氣下入淵
腋前傷任脈內熏肝肺十餘日死太素無日項前日頸一云發頭以前十八種並
與千金翼劉涓子太素經范汪刪繁同並出第八卷中
千金論曰夫癰疽初發人皆不以為急此實奇患唯宜速療若
療不速病成難救以此致禍者不一發皆外皮薄為癰皮厚為
疽宜急治之夫癰壞後有惡肉者以猪蹄湯洗去穢次傅食肉
膏散惡肉盡傅生肉膏散及摩四邊令善肉速生當斷絕房
室慎風冷勞煩待筋脉平復乃可任意耳不爾新肉易傷傷則
重潰發發則禍至慎之慎之
凡癰疽始發或似小節或復大痛或復小痛或發如米粒大白
膿子此皆微候宜善察之見有少異即須大驚忙須急治之及
斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥即灸當頭百壯其大重
者灸四面及頭上二三百壯壯數不慮多也復薄冷藥貼膏種種
救療必差也
又其用藥貼法皆須當瘡中處開孔令泄瘡熱氣出亦當頭
以大針針入四分即差
身中忽有痛處似打狀名曰氣痛痛不可忍遊走不住發作有
時痛則小熱痛定則寒此皆由冬受溫風至春暴寒風來折之

靜嘉堂文庫所藏

不成溫病乃作氣痛也又宜先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煮楊柳皮及煖熨之有赤氣點點刺出血也其連翹湯可服數劑及竹瀝湯勿以一劑未効便謂即止遂不服耳中間將白斂散佳

素問曰寒氣客於經絡血凝澀不行擁結爲癰疽也不言熱之作也其後成癰又陽氣湊集寒化爲熱熱盛則肉腐爲膿也

又以酢和蜂蛤灰塗之乾即易差即止

凡腫根廣一寸以下名癤一寸以上名小癰如豆粒大者名皰子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取差止並出第二十三卷中

廣濟療癰疽排膿散方

黃耆十分膿多倍　青小豆一分熱口乾倍　芎藭三分肉不生倍　芍藥三分痛不止倍

白斂三分有膿不合倍　栝樓三分若渴小便利倍　甘草三分炙

右七味爲散酒服方寸匕日三服不利忌海藻菘菜熱麪魚蒜等千金同一方無白斂有甘草

又療發癰疽排膿散方

人參二兩　當歸二兩　桂心二兩　芎藭一兩

厚朴一兩炙　甘草二兩炙　防風二兩　白芷二兩

桔梗一兩

右九味擣篩爲散以酒服方寸匕日二服不利若瘡未合常服之忌生冷菘菜海藻生葱蒜並出第五卷中

劉涓子療癰疽先宜傅大黃食肉膏方在發背部千金方食惡肉散後用大黃附子等十物者乃是次第膏方

當歸　芎藭　白芷各二兩　烏頭一兩

巴豆二十枚去皮　松脂二兩　豬肪二升

右七味㕮咀內膏中微火合煎三沸已內松脂耗令相得

靜嘉堂文庫所藏

以綿布絞去滓以膏著綿絮兊頭大瘡雖深兊之膿自出
就兊盡即生善肉瘡淺者不足兊著瘡中日三惡肉盡即止

又療癰疽發壞出血生肉黃耆膏方

黃耆（一兩） 芍藥（一兩） 當歸（一兩） 大黃
芎藭 獨活 白芷 薤白
生地黃（各一兩）

右九味切猪膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傳兊瘡中
摩左右日三文仲同並出第四卷中

又療癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆 細辛 生地黃 蜀椒
當歸 芍藥 薤白 白芷
芎藭 丹參（各一兩） 猪膏（一升半臘月者） 甘草
蓯蓉 獨活 黃芩（各一兩）

右十五味以苦酒一升二合夏月漬一宿冬月二宿微火煎
三沸煑酒氣盡成傳之忌海藻菘菜生葱蕪荑

又療癰疽始作便壞熱毒發瘡膏方

羊髓（一兩） 甘草（二兩） 胡粉（五分一法五兩） 大黃（一兩半）
猪膏（二升）

右五味切合膏髓煎三味烊內甘草大黃三上三下絞去滓
內胡粉絞令調和傳瘡上日五度

又療癰疽已潰白芷摩膏方

白芷 甘草（各二分） 烏頭（三分） 薤白（十五挺）
青竹筎（一雞子大一枚）

右五味切以猪膏一升合煎白芷黃膏成絞去滓塗瘡四
邊勿著瘡中並出第五卷中

深師內塞散療癰疽潰漏血脉空竭方

靜嘉堂文庫所藏

黃耆　細辛　芍藥　薏苡人
白芷　瞿麥各二兩　赤小豆七兩　乾地黃
人參　防風各二兩

右十味切先以新成白苦酒置新器中內赤小豆須臾出銅器中熬令燥復須內苦酒中更熬凡五反止合擣爲散酒服方寸匕日夜六七過腹痛甚倍芍藥口未閉倍薏苡人膿多倍黃耆忌生菜生葱蕪荑出第二十八卷中

刪繁療癰疽等毒潰爛猪蹄洗湯方

猪蹄一具治如食法　薔薇根一斤　甘草五兩炙　芍藥五兩
白芷五兩

右五味切以水二斗煑猪蹄取八升去滓下諸藥煑取四升稍稍洗瘡出第九卷中

千金翼黃帝問曰有疽死者柰何岐伯曰身有五部伏菟一腨二脣六背三五藏之腧四項五五部有疽死也刪繁同一本云靈樞

又王不留行散主癰疽及諸雜腫潰皆服之亦療癰腫不潰苦困無賴方

野葛皮半分　五色龍骨五兩　王不留行子二升千金方用末三合翼云二升
桂心一兩　當歸二兩　乾薑一兩　栝樓六合末

右七味爲散食訖溫酒服方寸匕日三以四肢習習爲度不知漸漸加之此浩仲堪方隨日齊闍梨施行實爲神散癰腫即消極理安穩忌生葱冷水等物此方妙千金同出第十四卷中

癰腫方二十五首

集驗療癰腫大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之即復者有膿若當上破者膿出不盡不盡稍深食骨骨碎出當以角導側際從下頭破令膿出盡出盡則骨生愈

靜嘉堂文庫所藏

矣若惡肉不盡者食惡肉藥去之膏塗之即愈食肉藥方

取白荻灰水淋之煎令如膏此不宜預作作之十日則歇并可以去黑子黑子藥住便即拭去不時拭則傷膚

又一方以桑皮灰亦妙

凡破諸病肉厚處當先膚封四面不爾瘡披裂氣泄便死不可救也以前並注同有久癰餘瘡爲敗癰深疽有脛間喜生瘡中外惡瘡霜寒凍不差經年或骨疽亦名脛瘡深爛青黑四邊堅強中央膿血惡汁出百藥療不差汁潰好肉處皆腫亦有碎骨從中出者可温赤龍皮湯洗之夏月日日洗之冬月三日四日一洗潰肉多者可時傅白蔄茹散食去之可一日之中三四傅之止後長傅家猪散得差也

取猪矢燒作灰下絹篩以粉疽敗瘡中令滿汁出膿去便傅之長傅須差也若更生青肉復著白蔄茹

散如前法也出第八卷中

千金翼凡五子日夜半　五丑日雞鳴　五寅日平旦
五卯日日出　五辰日食時　五巳日禺中　五午日日中
五未日日昳　五申日晡時　五酉日日入　五戌日黃昏
五亥日人定

右以此日時遇疾發者皆不起也出第二十三卷中

廣濟療癰腫膿潰內服藥外宜貼膏方

松脂一斤鍊者　䐈脂三合生　椒葉一兩　白臘三兩
蛇銜一兩　黃耆一兩　芎藭一兩　白芷一兩
當歸一兩　細辛一兩　芍藥一兩

右十一味切以水先煎脂臘烊盡內諸藥三上三下白芷色黃膏成用剪故帛可瘡大小塗膏貼上日夜各一

又療癰腫膿潰瘡中有紫肉硬不消以此散兌頭內蝕之方

靜嘉堂文庫所藏

石硫黃二分研　馬齒礬石二分熬令汁盡　漆頭䕡茹二分

麝香二分研　雄黃二分　雌黃一分研　白礬二分熬令汁盡

丹砂二分研

右八味擣篩爲散搜令調和以傅瘡中并傅息肉上貼膏日二易千金并翼深師同並出第三十卷中

劉涓子療癰腫方

白斂　烏頭炮　黃芩各等分

右三味擣下篩和雞子白傅上即愈出第十卷中

療癰腫有熱黃耆貼方數用神驗

甘草炙　大黃　白斂　黃耆

芎藭

右五味各等分擣篩以雞子黃和如濁泥塗布上隨赤熱者堅處大小貼之燥易甚効

劉涓子療癰腫白斂薄貼方

白斂　當歸　芍藥　大黃

莽草　芎藭

右六味各等分擣篩下雞子黃和如泥塗布隨大小貼之燥易

又療癰腫堅核下不消白斂貼之方

白斂　大黃　赤石脂　芍藥

莽草　黃芩　黃連　茱萸

右八味各等分擣篩以雞子黃和如濁泥塗布上隨核大小貼之燥易

又療癰腫黃耆貼之方

黃耆一兩半　黃芩一兩　芎藭一兩　黃連

白芷　芍藥各一兩　當歸一兩半

右七味擣篩以雞子白和如膏諸暴腫起處以塗著而上已

靜嘉堂文庫所藏

貼燥易腫處不覺貼令便愈熱勢毒者加白斂一兩尤佳

又療癰腫黃耆貼方

黃耆　大黃　白芷　牡蠣熬

白斂

右五味各等分擣篩和雞子貼燥易

又療癰腫已潰四物黃連薄貼方

黃連　黃蘗　地楡　白芷各一兩

右藥擣篩雞子白和塗布薄癰上對瘡口穿布出癰氣令疎氣

又療癰腫一物栝樓薄貼方

以栝樓根隨多少止一物切五反内苦酒中熬燥擣篩之苦酒和塗紙上以貼癰腫上服散人宜用並出第九卷中

千金療癰腫松脂貼方

當歸　黃耆　黃連　芍藥

臘　黃芩　芎藭　大黃各一兩細切

松脂一斤半　膃脂一合半

右十味切以微火煎之三上三下綿布絞去滓向火炙塗生踐紙上隨大小貼之一日三度易之即差

又療腫蒺藜散方

蒺藜子一升熬令黃

右一味擣篩以麻油和之如泥炒令焦黑以塗故布上剪如腫大勿開頭搨上無蒺藜子用小豆和雞子如前乾則易之甚妙

又搨湯方

大黃　黃芩　白斂各三分　芒消六分

右四味以水六升煮取三升以故帛四重内汁中以搨腫上燥

靜嘉堂文庫所藏

復易晝夜爲之翼同

又癰腫痛煩困方

以生楸葉十重貼之以布帛裹緩急得所日二易止痛消腫食膿血良無比勝於衆貼冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之亦可薄削楸皮用之備急張文仲肘後同

又諸癰腫牢堅諸藥不療方

削附子如碁子厚一指正著腫上以少唾濕附子火炙附子令熱徹附子欲乾輙令更唾濕之常令附子熱氣入腫中無不愈者此法絶妙並出第二十三卷中

千金翼黃耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渴方

黃耆　升麻　栝樓　乾地黃各二兩

麥門冬去心　芍藥各二兩　黃芩半兩　梔子二十枚擘

右八味切以水一斗煮取三升分三服劉涓子用升麻一兩梔子十四枚餘藥同

又白歛薄貼主癰腫方

白歛　大黃　黃芩各等分

右三味擣篩和雞子白如泥塗布上薄貼腫上乾則易之可以三指撮藥末內三升水中煑三沸綿注汁拭腫上數十遍以寒水石末和塗腫上以紙覆之乾則易之一易輙以煑汁拭之日夜三十度劉涓子同

又療癰腫方

伏龍肝以大酢和作泥塗布上貼之乾則易之

又凡腫已潰未潰者方

以膠一片水漬令軟納納然擣腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡

靜嘉堂文庫所藏

未有膿者腫當自消矣
又方
燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差爲度至良
又溫中湯主癰腫取冷過多寒中下利食完出方
甘草炙　乾薑　附子各六分炮　蜀椒二百十枚
右四味切以水六升煑取二升分三服忌海藻菘菜豬肉冷
水劉涓子同出第二十三卷中
張文仲劉涓子療癰消膿木占斯散方
木占斯　桂心　人參　細辛
敗醬　乾薑　厚朴炙　甘草炙
防風　桔梗各一兩　栝樓一兩
右十一味擣爲散服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰及疽灸亦
不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已壞發膿者內敗醬
此藥時有化癰疽令成水爲妙
隱居必効方消癰腫
白斂二分　藜蘆一分
右二味擣爲末以苦酒和如泥貼腫上日三大良以上二首
備急同出第五卷中
石癰方五首
千金堅如石核復大色不變或作石癰療之鍊石散方
鹿角八兩燒作白灰　白斂三兩　麤理黃石一斤碎五升先燒石令赤內醋中復燒內之醋盡半止
右三味擣篩作細末以餘醋拌和如泥厚塗之乾即塗取消
止盡更合諸偏療癧藥悉皆主之並須火針瘡上塗之膏
又方
單磨鹿角半夏塗不如上方佳也集驗文仲小品古
今錄驗同

靜嘉堂文庫所藏

又療石癰堅如石不作膿方
以生商陸根㵎擣傅之燥則易又治腦及諸癰癤
古今錄驗同
又方
以蜀桑根白皮陰乾擣末消膠以酒和蜀桑根白
皮傅上即拔出並出第二十三卷中
備急療若發腫至堅而有根者名曰石癰也方
灸腫上百壯當石子破碎出如不出益壯乃出其癰
疽石癰結筋瘰癧皆不可針角針角殺人集驗文仲
千金同出第四卷中
癰癤方一十四首
劉涓子療癰癤諸腫有熱方
地黃三斤洗細切

右一味以水一斗煮取三升去滓煎湯令小厚以塗紙當瘡
中央貼之日再三易數用大良并療牛領上腫出第十卷中
集驗療癰及癤如結腫赤熱者方
以水磨半夏塗之燥復更塗得流便消也出草中
可自掘生半夏乃佳此療神勿不信也出第八卷中
千金療凡癤無頭者方
吞葵子一枚即出勿多服頭多也
又方
燒葛蔓灰封上自消
又方
牛糞封之佳
又方
以鼠粘葉貼之
又方
用米和雀糞傅之
又方
狗頭骨　芸臺子

靜嘉堂文庫所藏

右二味等分爲末和酢封之
又療癰癤潰後膿不斷及諸物刺傷不差方
取石硫黃三兩粉之一味筋一片碪頭令碎少濕之內
石硫黃中刺瘡孔以瘡差爲度
又乾地黃丸主虛熱消瘡癤方
乾地黃四兩 大黃六兩 桂心二兩 芍藥三兩
茯苓三兩 王不留行二兩 黃芩二兩 麥門冬二兩去心
遠志二兩 升麻二兩 人參二兩 甘草二兩炙
枳實二兩炙
右十三味擣篩蜜和丸如梧子大酒服十丸日三加至三十丸
長服令人肥健翼同
又地黃煎方補虛除熱可將和服取利也散石癰疽瘡癤痔熱者
宜服百日癰疽永不發也

取生地黃隨多少三擣三押取汁令盡一味以新布重
絞其汁澄清置銅器中湯上煑之減半復下更新布
絞去麤碎結濁者滓穢盡復煎之濃竭令如飴糖置
甆器中酒服如彈丸大日三勿加至百日服之有驗
又梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤大小
便不利方
芒消二兩 大黃四兩 梔子二七枚擘 黃芩三兩
知母二兩 甘草一兩炙
右六味切以水五升煑減半下大黃煑取一升八合去滓內
芒消三兩分三服忌海藻菘菜並出第二十三卷中
千金翼論曰一切癰疽皆是瘡痕根本所患癰之後膿汁不止
得冷即是鼠瘻是以漏方次之大須急救之
馬齒草五升切 榔白皮一斤水五升煑取一升清澄 麝香半兩[illegible]乾之研作末

靜嘉堂文庫所藏

杏人半升油煎令黑擣如膏

右四味以甆器貯之合和以三四重帛蜜繫自痛已成瘡者以泔清淨洗拭乾剪作貼子塗藥貼著瘡上日三易若未作瘡如作瘰癧子者以艾一升熏黄如棗大乾漆如棗大末之釜月下土三味並末和艾作炷灸三七壯出第二十三卷中本方療鼠瘻

又主癤腫方

生椒末麪末釜月下土末之以大酢和傅之並出第二十四卷中

附骨疽方七首

千金論附骨疽法凡附骨疽者無故附骨成膿故名附骨疽喜著大節解中丈夫產婦喜著髀嬰兒亦著脊背丈夫急者先覺痛不得動摇按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪腫如肥狀是也小兒纔近便大啼呼即是肢節有痛候也大人緩者先覺肥洪洪然經日便覺痺痛不隨小兒四肢不能動摇亦如不隨狀著肢節解中有洪洪處不知是附骨疽令遍身成腫不至潰死體皆青黯大人亦有不別是附骨疽呼為賊風風腫也

又凡人身體患熱當風取涼風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沈重忽忽耳鳴又秋夏露卧為冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷何意而有此疾由其血氣盛肌膚為風冷折之即腠理凝結故也

又凡骨疽者久瘡不差差而復發骨從孔中出名為骨疽方

以猪膽和楸葉擣封之

又方

擣白楊葉下篩傅之

又方

穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎五升以艾及

靜嘉堂文庫所藏

荆葉和之令可然火令煙出內疽孔坈中以衣擁坈
口勿洩煙半日許當有蟲出
又癰疽敗及骨疽方
末龍骨粉瘡四面厚二分
又方
用自死蝦蟇一枚頭髮一把以猪膏一斤半內二物
煎之消盡下之欲冷內鹽一合攪和以膏著瘡
中日一易蟲出如髮蟲盡愈
又骨疽百方療不差方
可瘡上以艾灸之三日三夜無不愈也並出第二
十三卷中
備急若骨疽積年每一年一發汁出不差方
取膠熬擣末粉瘡上及破生鱧魚以搨之如
食頃刮視其小蟲出更洗更傅蟲出盡止備急文
仲同
又療疽瘡骨出方
黃連 牡蠣各二分熬
右二味末先以鹽湯洗以粉之文仲同出第四卷中
瘭疽方一十六首
集驗論胷中痛少氣急入闇中以手掩左眼音視右眼見光
者胷中結癰也若不見光瘭疽內發若吐膿血此不療之疾
宜以灰掩膿血上不爾著傍人也又齒間臭熱血出是瘭疽
也七日死療所不差宜以灰掩地血瘭疽喜著指與代指相
似人不別者亦呼作代指不急療其毒逐脉上入藏殺人也
南方人得此疾皆斬去指恐其毒上攻藏故瘭疽著指頭者
其先作黯疱然後腫赤黑黯瘆痛入心是也出第八卷中

靜嘉堂文庫所藏

千金瘭疽論說曰瘭疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤黑青白不定一種其狀有根不浮腫痛瘮應心根深至肌少久便四面悉腫皰黯默紫黑色能爛壞筋骨也毒散逐脉入藏殺人南方人名為搨著毒著厚肉處即割去之亦燒鐵烙疱上令焦如炭亦疱上灸百壯為佳單擣酸草葉傅腫四面防其長大飲葵根汁及藍青汁若犀角汁升麻汁竹瀝汁黃龍湯諸單療折其勢耳其病亦喜著指故與代指相似人不識之呼作代指不急療之亦逐脉上入五藏殺人南方人得之皆斬去指瘭著指初指頭先作黯疱然後腫赤黑黯瘮痛入心是也復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不療自長出不止不痛痒此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾療之宜服漏蘆湯外燒爍日日為之令焦盡竟以升麻膏傅之積日乃差備急同出

第二十三卷中

劉涓子療瘭疽侵淫廣大羊髓膏方

羊髓二兩　大黃　甘草炙　胡粉各二兩

右四味㕮咀以猪膏二升半合煎微火三上三下絞去滓傅日四五深師云兼療赤黑爛壞成瘡出第五卷中

千金療瘭疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈復發方

黃耆六分　款冬花二分　升麻四分　附子一分炮

苦參一分　赤小豆一分

右六味下篩酒服半錢匕漸增至一錢日三服忌猪肉冷水范汪方無苦參有赤小豆

又方

虎糞白者以馬尿和之暴令乾燒灰粉之翼同

又方

靜嘉堂文庫所藏

胡粉 青木香 龍骨 滑石各三兩

右四味下篩以米粉一升和之稍以粉之日四五

又方

竈室塵 竈突中墨 竈釜底土各一升

右三味合研令勻以清水一斗煑三沸取汁洗瘡日二三度

又凡瘭疽手足肩背忽䘌䘌如赤小豆刺之汁出者是瘭之方

剝却瘡皮溫泔清洗胡鷰窠和百日男子矢塗之

又方

熬蕪菁子熟擣帛裹傅之勿止文仲備急肘後同

又方

熬麻子末摩上日五六度

又方

麪和酒傅之

又方

鯽魚三寸長者亂髮如雞子大猪脂一升煎以成膏塗之

又療瘭疽秘方世所不傳神良無比

射干 甘草炙 升麻 枳實炙各二兩

大黃十分 麝香二分研 乾地黃二兩 犀角六分屑

前胡三兩本方云三分

右九味切以水九升煑取三升分三服差止不限劑數翼同

深師加黃芩十分餘同忌海藻菘菜蕪荑

又瘭疽漏蘆湯方

漏蘆 白斂 黃芩 麻黃去節

白薇 枳實炙 升麻 芍藥

甘草各二兩炙 大黃三兩

右十味切以水一斗煑取三升分三服無藥單用大黃下之

良張文仲備急并翼並同

又升麻膏方

靜嘉堂文庫所藏

升麻　白薇　漏蘆

芒消各二兩　黃芩　蛇銜　枳實各二兩炙

梔子人二十一枚　蒴藋四兩

右十味切擣破令細然以水三升漬半日以猪膏五升煎

水氣竭去滓傳諸丹毒皆用及熱瘡腫上並日三易之

又升麻揩湯方

升麻　漏蘆　芒消各二兩　梔子二十枚

黃芩三兩

右五味切以水一斗合蒴藋五兩煑取七升冷揩諸丹腫

上常令濕內宜服漏蘆湯甚佳

又療瘭疽侵淫多汁日就浸大胡粉散方

胡粉二分熬　黃連三分　甘草二分炙　䕡茹二分

右四味下篩以粉瘡上日三翼文仲備急深師同並出第二十

三卷中

千金翼薄搶湯主瘭疽侵淫欲作未成或如桃李核或如雞

子赤焮方

甘草炙　黃芩　大黃　黃連

當歸　芒消各一兩

右六味切以水一斗煑取三升絞去滓鐺中下芒消一沸攪

之貼布帛中以搶腫上數百遍劉涓子深師同出第二十

三卷中

緩疽方四首

集驗論有緩疽者初結腫形似癰回回無頭尾其色不異但痛

深有根核又與皮肉相親著外耳一名肉癰其有大者如拳小者

如桃李狀積日不消喜變紫色黯黑乂即皮肉俱爛如牛領瘡狀

便通體遍青黯色而不作頭穿潰出膿初作服五香連翹湯鑱去

靜嘉堂文庫所藏

血以小豆薄塗之其間數針鑱去血又薄之取消也若不消色未
變青黯者以鍊石薄之若失時不得療已爛者猶服五香連翹
湯及漏蘆湯下之隨熱多少投方也外以升麻湯搨洗之薄升麻
膏若生臭惡肉者可以單行一物白蕳茹散傳之青肉去盡便
停也好肉既生但傳升麻膏良不生單傳一物黃耆散也若傳
白蕳茹散積日青惡肉不盡者可以漆頭赤皮蕳茹取半錢
上和三大錢上白蕳茹散中合和傳之惡肉去盡還以淳用白
蕳茹散也視好肉欲生可傳黃耆散也黃耆散方白蕳茹散
方漆頭蕳茹散方並一味單行隨多少擣篩為散出第八卷中

范汪飛黃散療緩疽惡瘡食惡肉方

取丹砂著瓦盆南雌黃著中央磁石北曽青東白石
英西礜石上石膏次鍾乳下雄黃覆雲母薄布下各
二兩先擣篩瓦盆中以一盆覆上羊毛泥令厚作三隅
竈燒之以陳葦一日成取其飛者使之甚妙

又療緩疽以飛黃散食惡肉令盡作土竈熏之方

雄黃一兩　雞白屎一兩　藜蘆一兩　丹砂一兩
乾鰻鱺魚一兩

右五味擣下篩青布裹之熏經三日乃止止畢要以蛇銜
膏摩之良並出第三十一卷中檢范汪方其蛇銜膏令檢崔
氏方附於後

崔氏蛇銜膏療癰腫瘀血産後血積耳目暗等牛領馬鞍瘡方

蛇銜一兩　大黃　附子去黑皮　芍藥
當歸　細辛　黃芩　大戟
椒去目　莽草　獨活各一兩　薤白十四莖

右十二味並切之以苦酒淹之一宿以不中水成鍊猪膏三升龍
銜藤一兩合膏煎名龍銜膏今又有龍草似蛇銜而葉大耳

亦有取其根合煎者亦名龍銜膏出第二卷中

小品療緩疽初作即以小豆薄塗之亦消也出第十卷中

發背方四十一首 並乳石發背自有正方在第三十八卷中具述

千金論曰凡發背皆由服餌五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服諸石而自發背者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或痒仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至不救其臨困時方圓徑三四寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔之膿皆反出尋即失音不言所以養生者小覺背上痛痒有異即取淨土冷水和泥捻作餅子徑一寸半厚二分以麤艾大作炷灸泥上貼著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅即差若榆莢大灸二七炷即差至錢許大日夜灸不住乃差并服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈又常以冷水射之漬冷石熨之日夜勿止差止

又方

凡腫起於背胛中頭白如黍粟四相連腫赤黑令人悶亂者名發背也宜禁陽事酒蒜麪若不灸療即入内殺人可當瘡灸七八百壯有人不識多作雜腫療皆乃死

又方

取三年酢滓微火煎和牛脂封上日一易之

又方

取亂髮灰酒服一方寸匕

又方

狗牙灰酢和封之差

又方

靜嘉堂文庫所藏

取猪羊脂封文亦療發乳

又方　以蛇頭灰水和傅之

又方　飲鐵漿三升下利爲佳

又方　以鹿角灰酢和塗之古今錄驗同

又方

燒古蜯末之如粉雞子白和傅上日三即差止

又發背及癰疽潰漏并未潰毒腫方

栝樓　榆皮　胡鷰窠　鼹鼠

女人月水布洗取汁

右五味並須等分以月水汁和如泥封腫上乾即易之潰者

四兩封亦覺即從二日至五日令差翼同

又療癰疽潰漏發背及小小瘰歷李根散方

李根　半夏洗　栝樓各一升　甘草二兩炙

芎藭一兩半　白斂一兩　桔梗三兩　厚朴一兩炙

葛根三兩　桂心四兩　當歸二兩　通草一兩

黃芩二兩　芍藥四兩　附子一兩炮

右十五味爲散酒服方寸匕日三瘡大困者夜再服朱大明

患發背骨出身有三十餘癰癤服此差忌羊肉餳海藻菘菜

猪肉冷水生葱范汪同

又治諸虛不足發背癰疽經年差後復發或由大風聚結毒氣

在內閉塞得夏月出攻背不療積聚作膿血爲瘡內漏大內塞

排膿散方

山茱萸　五味子　茯苓　乾薑各六分

當歸四分　附子二分炮　肉蓯蓉八分　瞿麥三分一云地麥地膚子也

石斛五分　菟絲子三分酒漬　巴戟天八分　遠志八分去心

人參五分　甘草五分炙　麥門冬八分去心　石韋四分

靜嘉堂文庫所藏

芎藭四分 芍藥五分 乾地黃八分 桂心五分

右二十味爲散酒服方寸匕日三夜一稍加至兩七長服終身不發癰癤忌猪肉冷水海藻菘菜生葱蕪荑醋物等

又內補散療癰瘡發背方

蜀升麻 黃芩 人參各二分 乾薑

白歛 桂心 甘草炙 附子炮

防風各一兩 芎藭二兩 赤小

右十一味爲散酒服方寸匕日三夜再忌猪肉冷水海藻菘菜生葱一六蜀椒非

又內補散主癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸 桂心 人參各二兩 芎藭

厚朴炙 桔梗 甘草炙 防風

白芷各一兩

右九味爲散酒服方寸匕日三夜再豬未合服勿停忌海藻菘菜生葱范汪同

又瞿麥散主排膿止痛利小便方

瞿麥二兩 芍藥二兩 桂心半兩 赤小豆半合

芎藭半兩 白歛半兩 黃耆一兩 當歸二兩

麥門冬二兩去心

右九味爲散先食溫酒服方寸匕日三翼深師同忌生葱陳臭肉汁等

又薏苡人散主令癰自潰長肌肉方

薏苡人 桂心 乾薑 白歛

當歸 肉蓯蓉各二兩

右六味爲散先食溫酒服方寸匕日三夜再翼同忌生葱

又黃耆竹葉湯主胷背遊熱癰疽方

靜嘉堂文庫所藏

生地黃八兩 黃耆 甘草炙 芍藥
黃芩 麥門冬去心各三兩 人參 石膏碎綿裹
芎藭 當歸各二兩 生薑五兩 大棗三十枚擘
半夏四兩洗 淡竹葉切一升
右十四味以水一斗二升煑竹葉取九升去滓內藥煑取三升分四服相去如人行五六里再服日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳古今録驗同

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛方
防風 茯苓 白芷 桔梗
遠志去心 甘草炙 人參 芎藭
當歸 黃耆各一兩 桂心二分 附子二枚炮
厚朴二兩 赤小豆五合熬
右十四味擣散酒服方寸匕日三夜一忌酢猪肉海藻菘菜生葱冷水

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背上惡肉方
麝香研 雄黃研 真珠研各一兩 礬石一兩熬
右四味細篩以猪膏攪令如泥塗惡肉盡止更傅生肉膏佳

又療癰疽敗壞生肉膏方
生地黃一斤 辛夷一兩 獨活一兩 當歸一兩
黃耆一兩 大黃一兩 芎藭一兩 薤白五兩
白芷一兩 芍藥一兩 黃芩一兩 續斷一兩
右十二味切以臘月猪脂四升煎傅之佳

又方
大黃 附子炮 芎藭 雄黃
真珠各一兩 白斂 礬石燒 黃芩
藺茹各二兩 雌黃一兩 莽草一兩

静嘉堂文庫所藏

右十一味先以猪膏一升半煎六沸去滓内藺茹礬石末
攪之塗瘡上惡肉盡止劉涓子同

又方

藺茹者(漆頭)　礬石(各二分熬)　雄黃(二分研)　硫黃(二分)

右四味爲散内瘡口中惡肉盡止勿使過好肉也

又發背上初欲作腫即服此方

梔子人(一百枚)　大黃　升麻　黃芩
甘草(炙各三兩)

右五味切以水九升煮取三升半分三服使利便止不下更進一服忌海藻菘菜文仲備急同並出第二十三卷中從瞿麥散以下十方並療發背部中已次之

范汪療癰腫發背虎牙散方

虎牙(炙)　乾薑　附子(炮)　當歸
甘草(炙)　防風　桂心　王不留行
茯苓(各一兩)

右九味擣下篩服方寸匕日三飲服之忌海藻菘菜猪肉冷水生葱酢物出第三十一卷中

又療癰發背排膿内補鐵屑散方

當歸　人參　細辛　甘草(炙)
蓯蓉　黃耆　桂心　防風
黃芩　鐵屑　芎藭　芍藥

右十二味各等分合擣爲散服方寸匕忌海藻菘菜生菜生葱酢物

又療癰腫牢核發背成膿莽草膏方

莽草　芎藭　當歸　細辛
附子(炮)　黃芩　烏頭(炮)　牛膝

靜嘉堂文庫所藏

躑躅　野葛　茯苓　防風
杜蘅各一兩　猪脂二斤
右十四味切用猪肪合煎去滓傅瘡上日再忌猪肉冷水
生菜大酢
又卓氏曰膏療癰疽發背金瘡已壞及未敗火瘡諸瘑疥
患療之方
當歸　附子炮　細辛　芎藭
續斷　牛膝　通草　甘草炙
白芷各二兩　蜀椒三合　芍藥　黄耆各一兩
右十二味㕮咀以猪膏二升煎之微火上以白芷色黄藥成
絞去滓以傅瘡上日三過忌海藻菘菜猪肉
又療發背發乳房及諸惡瘡膏方
黄連　當歸　馬齒　芎藭

署預各一兩　珣珠十四枚　礬石半兩燒　黄蘗半兩
石韋三分去毛　生竹皮三合　猪肪一斤
右十一味㕮咀之細切肪向美酒一升中合煎石韋焦膏成去
滓有病稍稍傅上亦酒服棗核大一枚忌猪肉冷水並出第
四十一卷中
救急療發背百無不差方
取猪羊脂切作片冷水浸取貼上暖徹易之五六十
片即差若初貼少許即寒寒定好眠甚妙
又療發背若初覺赤腫腫上作小瘡疼不可近方
急用鈹刺上七八鈹取冷水用筒擊射腫上日夜
不止疼歇腫消出第五卷中
又療發背方
取白麪搜圍腫四畔令童子七人尿潰之

靜嘉堂文庫所藏

又方　以馬糞封之乾易婦人發乳亦差
又方　取蔚臭草擣取汁服一雞子滓封上熱即易之
又方　擣地菘汁一升日再服以差止
又方
大黃　石灰熬　小豆
右三味等分末白酒和塗立効並出第六卷中忌羊肉
熱麪大酢
近効凡發背皆發出自腸胃流入五藏仕流多脚氣爲主或有
先服乳石并熱肉麪并失飢房室過度皆作此疾縱身不曾服
乳石先代服亦有此病或有下里人服麪過度亦有患者請係
後方萬不失一發背亦覺有腫即須審看根硬軟如硬頭一
點白燒四邊紫黒色時掣痛憎寒不食狀若天行此石癰知
是此狀即須當上灸一百壯艾炷大如鼠屎許大凡發背初亦
一點白四邊赤色漸漸長大或盃盞并椀許大四邊生皰欒小
小瘡如粟米許大亦時時抽掣痛此兩狀皆是死病十日内堪
醫十日以外不濟就中冬月得此病即延得三五日其發背初
覺即須當頭灸二十一壯如盃許大即五花灸之各二十一壯
即服牛蒡子栝樓葛粉第二服犀角湯瀉之不然服犀角
丸亦得大効也忌梨鯉魚麪酒肉漿水粥眞鴻臚賈顯録
凡發背候憎寒壯熱身如拘束或口乾不用食瘡初出如青紫
色者毒重赤者輕膿如稀泔者極重膿稠白赤者輕張道士昇
玄房陵口録留
又療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫隱軫起方
消石三兩
右一味以煖水一斗和令消待冷取故青布疊三重可似欲赤

靜嘉堂文庫所藏

處方圓濕布搨根熱即換之頻易差

又療發背及一切毒腫方

生麻油六合　黃丹二大兩半　生栗子四十九枚畢大小中者蒸熟去皮碎篩

地膽兩錢搗碎篩

右四味和於銅器中盛用炭火重湯煎候沫溢出與器口欲平取小麥一合分二人嚼取筋急内藥中攪使與相和膏成下安銅器於冷水中成膏訖以故帛塗膏貼所苦處晨夕換膏

又療前瘡定訖令生肌方黃四兩外云檢劫

麝香兩錢　棗皮灰兩半　生麻油六合

右三味依法和用火重湯上煎十餘沸稀稠前藥相似取故帛塗膏貼瘡上膏漸取瘥減唯得喫白羊頭肉但是豆並不得喫餘如藥法

又療癰腫犀角丸主腸癰乳癰發背一切毒腫服之化為水神驗方

犀角十二分　蜀升麻　黃芩各四分　大黃五分

防風四分　巴豆二十二枚去心皮熬令黃　人參四分　當歸四分

黃耆四分　乾藍　黃連　甘草炙

梔子人合四分

右十三味擣為末別擣巴豆成膏内末和以杵研擣令相得鍊蜜和擣更擣二三百杵煖湯服三丸如梧子得利三兩行喫冷粥止即差不利加至四五丸初服取快利後漸減丸數取鴨溏微洩為度老小以意增減腫消及和潤乃止利却黃水即覺輕皮皺色變一切腫皆内消神驗不可論忌熱麪蒜猪肉蘆筍魚海藻菘菜生冷粘食以上並主發背

癰疽發背雜療方二十六首

劉涓子療發背發乳口已合皮上急痛生肉摩踠折丹參膏方

丹參　防風　白芷　細辛

靜嘉堂文庫所藏

芎藭 黃芩 芍藥 牛膝
大黃 槐子 獨活 當歸各一兩

右十二味切以臘月猪脂五升微火煎三上三下膏摩病日三四不須向火古今錄驗同出第五卷中

肘後療諸癰疽發背及乳方

熬粱粉令黑雞子白和之以塗練上貼癰小穿練上作小口以泄毒氣令散燥復易之此藥神効文仲備急同

又方

以釜底土擣取散以雞子中黃和塗之加少豉彌良以五月葫及少鹽佳文仲備急同一本無下一味

又方

取茱萸一升擣之以苦酒和貼癰上乾易之佳

刪繁療癰疽發背九物大黃薄貼方

大黃 黃芩各三兩 白芷二兩 寒水石五兩
白歛六兩 黃蘗二兩 石膏 赤石脂
黃連各三兩

右藥下篩以三合投粉糜二升中和之薄塗紙貼腫上燥易之腫下止不下厚傅之忌生冷熱麪大酢

又蝟皮散療諸瘻忍汗杉壞敗并主男子發背女子發乳等癰疽或膿血肉瘤方

蝟皮一具燒 杜仲八分炙 續斷六分 附子炮
地榆各五分 小露蜂房一具燒 厚朴八分 藁本五分
當歸 桂心各五分

右十味擣篩為散服方寸匕日三服酒進取差止忌猪肉生葱冷水

靜嘉堂文庫所藏

又陵鯉甲散療發背乳房癰腫方

陸鯉甲一頭取爪炙　桂心三分　當歸二分

右三味擣篩爲散服方寸匕日三服酒進忌生葱出第九卷中

千金療癰疽發背猪蹄湯方

猪蹄一具治如食法　黄耆　黄連　芍藥各三分

黄芩三兩　薔薇根　狼牙根各八兩

右七味以水三斗煑蹄令熟澄取二斗清切藥煑取一斗洗瘡一食頃以帛拭燥著生肉膏日二差生痂正痛加當歸甘草各二兩

又療癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉方

猪蹄一具　當歸　大黄　芎藭

芍藥　黄芩　獨活　莽草各一兩

右八味蹄取膝下斷治如食法以水二斗煑取八升內藥煑取四升去滓漬瘡兩食頃拭令燥以麝香膏傅之其方在前發背部中只有四味者是也

又生肉膏主癰疽發背已潰令生肉方

甘草炙　當歸　白芷　蓯蓉

蜀椒　細辛各二兩　烏喙六枚　薤白二十莖

乾地黄三兩　續斷一兩無以蛇銜替之

右十味以好酢半升相和漬二宿猪膏三斤煎令三沸三上三下膏成使用劉涓子同

又癰發腹背陰匿處通身有數十者方

取牛糞乾者燒擣下重絹以雞子白和以塗之乾復易秘之肘後張文仲備急同

又若已結膿使聚長者方

以生栝樓根細擣苦酒和傅上燥復易之末赤小豆亦佳

靜嘉堂文庫所藏

又凡發背爲癰疽已潰未潰者方
以香豉三升少與水和熟擣成强泥可腫作餅厚三分已有孔勿覆孔可腫上布豉餅艾列其上灸其豉使温温熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當減便得安或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出即差備急文仲并翼同

又癰腫發背初作及經十日以上腫勢焮熱毒氣猛盛日夜疼痛百藥不治者方
斷雞子一枚　新出狗矢如雞子大
右二味攪令調和微火熬之令稀稠得所捻作餅子腫頭堅處貼之以紙貼上以帛抹之時時看之覺餅子熱即易勿令動轉及歇氣經一夜定其多日患者三日貼一度差止並出第二十三卷中 雖援千金論曰此方穢惡不可施於貴勝然其愈疾一切諸方皆不及之自外諸方達復備貟作儀注而已學者當曉斯以備諸急云耳

千金翼諸癰腫發背及癰癤已潰爛疼痛方
蒸糜穀更遞熨之當即愈 一云蕎麥穀更炙熨之

又連翹五香湯主一切惡核瘰腫方
連翹　射干　升麻　獨活各二兩
桑寄生二兩　通草二兩　大黃三兩　丁子香一兩
青木香二兩　沈香二兩　薰陸香二兩　麝香二兩
右十二味㕮咀以水九升煮減半内竹瀝二升煮取三升分三服未差中間常服佳

又五香湯主惡氣毒腫方
沈香　青木香　丁香各一兩　薰陸香一兩
麝香半兩
右五味切以水五升煮取一升半分三服集驗方用雞舌香一兩不用丁香出第二十四卷中

靜嘉堂文庫所藏

崔氏療發背及諸瘡久不差有効方

先以甘草湯洗瘡裏拭極乾乃爵胡麻傅上乾即易從旦至日西去胡麻乃取黃連末滑石末中半相和以傅瘡上數數易明日又依前傅胡麻及黃連等末更不須洗瘡不過六七日即差必効備急同

又連翹湯療患瘡腫而渴方

連翹三兩　蜀升麻各二兩　黃芩三兩　枳實二兩炙
乾藍三兩　芍藥二兩　玄參二兩　白斂二兩
甘草二兩炙　羚羊角二兩屑　通草二兩　黃耆二兩
大黃三兩

右十三味切以水八升煑取二升半分三服利一兩行後更服去大黃乾藍即不利忌海藻菘菜

又犀角飲子方

犀角三兩屑　羚羊角三兩屑

右二味以水八升煑取三升渴即飲盡更作之時熱恐壞懸著并底甚妙

又五香連翹湯療惡瘡熱毒腫恐惡毒氣入腹兼取利以洩毒氣方

連翹五兩　蜀升麻二兩　薰陸香二兩　淡竹瀝一升
大黃四兩水一升別漬　朴消三兩熬乾別内　麝香一分研　青木香二兩
丁香一兩　獨活二兩　寄生三兩　射干二兩
甘草二兩　沈香一兩

右十四味切以水一斗煑取二升半絞去滓然後内大黃朴消竹瀝更煑一兩沸去滓内麝香分温三服服別相去如人行十里久以得利一二行爲度愼雞猪魚蒜生冷酢滑油膩麪食小豆五辛葵菜等備急文仲同並出第五卷中

静嘉堂文庫所藏

備急葛氏療始發諸癰疽發背及乳房方

皆灸上百壯肘後文仲同半夏末雞子白和塗之良姚云

生者神驗以水和塗之肘後文仲古今錄驗小品並同

又方

以酢和墓上土茱萸擣薑小蒜薄貼並良肘後文仲

同並出第四卷中

救急療熱毒風丹并發背犀角膏方

犀角六分屑　升麻十大分　羚羊角六分　梔子人二七枚

薤白一升切　吳藍八分大藍亦得　玄參六分　續斷

大黃　白斂　射干　白芷各六分

蛇銜一升切　寒水石十二分　黃芩六分　愼火草

麻黃六分去節

右十七味切以竹瀝三升生地黃汁五合漬藥一宿内猪脂

三升微火上煎十上十下候白芷黃膏成去滓塗病上出第

五卷中

文仲療發背及婦人發乳及腸癰木占斯散方

木占斯　厚朴炙　甘草炙　細辛

栝樓　防風　乾薑　人參

桔梗　敗醬草各一兩

右十味爲散酒服方寸匕日七夜四以多爲度病在上當吐

病在下當下膿血此謂腸癰之屬其癰腫即服療諸疽痔

若瘡已潰便早愈發背無有不療不覺腫去時長服去敗

醬多療婦人諸產瘤瘕益良是劉涓子方千金范汪刪繁

古今錄驗同出第五卷中

古今錄驗療諸癰瘡發背有膿血當歸貼方

當歸一分　蠐螬一分　丹參一分　附子一分炮

靜嘉堂文庫所藏

臘蜜一分 梔子十枚 桂心一分 膠一分

右八味合煎以貼瘡上出第二十一卷中

外臺秘要方卷第二十四

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦事趙 子孟 校勘

靜嘉堂文庫所藏